

新編金匱要略方論



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

新編金匱要略方論

張仲景述
王叔和集

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

新編金匱要略方論序

張仲景爲傷寒雜病論合十六卷。今世但傳傷寒論十卷。雜病未見其書。或於諸家方中載其一二矣。翰林學士王洙在館閣日。於蠹簡中得仲景金匱玉函要略方三卷。上則辯傷寒。中則論雜病。下則載其方。并療婦人。乃錄而傳之士流。才數家耳。嘗以對方證對者。施之於人。其效若神。然而或有證而無方。或有方而無證。救疾治病。其有未備。國家詔儒臣校正醫書。臣奇先校定傷寒論。次校定金匱玉函經。今又校成此書。仍以逐方次於證候之下。使倉卒之際。便於檢用也。又採散在諸家之方。附於逐篇之末。以廣其法。以其傷寒文多節略。故斷自雜病以下。終於飲食禁忌。凡二十五篇。除重複合二百六十二方。勒成上中下三卷。依舊名曰金匱方論。臣奇嘗讀魏志華佗傳云。出書一卷曰。此書可以活人。每觀華佗凡所療病。多尙奇怪。不合聖人之經。臣奇謂活人者。必仲景之書也。大哉炎農聖法。屬我盛旦。恭惟主上丕承大統。撫育元元。頒行方書。拯濟疾苦。使和氣盈溢。而萬物莫不盡和矣。太子右贊善大夫臣高保衡尙書都官員外郎臣孫奇尙書司封郎中充祕閣校理臣林億等傳上。

○大明應天徐鉉謹按。文獻通考二百二十二卷中。金匱玉函經八卷條下。晁氏曰。漢張仲景撰。晉王叔和集。設答問雜病形證脈理。參以療治之方。仁宗朝王洙得於館中。用之甚效。合二百六十二方。據此。并前林序云。依舊名曰金匱方論。則王洙館中所得。名曰金匱玉函要略方。係五代時改名耳。所

以通考只云金匱玉函經也。是金匱玉函經。元時已無矣。夫金匱玉函經八卷。東漢張仲景祖書名也。金匱方論三卷。傷寒論十卷。似西晉王叔和選集撰次後。俗傳書名也。若金匱玉函要略方。五代及宋。相沿書名也。今單名金匱要略。而去其玉函二字。愈遠而愈失其真矣。又據晉皇甫謐。甲乙云。仲景論廣伊尹湯液。用之多驗。王叔和撰次仲景選論甚精。指事施用。卽今俗所分傷寒論。金匱要略是也。孫真人千金云。江南諸師。祕仲景傷寒方法不傳。是叔和選論。思邈亦未曾研也。惟文潞公藥準云。仲景爲羣方之祖。朱奉議活人書云。古人治傷寒有法。治雜病有方。葛稚川作肘後。孫真人作千金。陶隱居作集驗。玄晏先生作甲乙。其論傷寒治法者。長沙太守一人而已。華佗指張長沙傷寒論爲活人書。昔人又以金匱玉函名之。其重於世如此。然其言雅。非精於經絡。不能曉會。若孫思邈。則未能詳仲景之用心者。是宋時纔分傷寒論。金匱要略爲二書也。成聊攝明理論云。自古諸方。歷歲浸遠。難可考評。惟仲景之方。最爲衆方之祖。是以仲景本伊尹之法。伊尹本神農之經。醫帙之中。特爲樞要。參今法古。不越毫末。乃大聖之所作也。劉河間原病式云。自黃帝之後。二千五百有餘年。有仲景方論一十六卷。使後之學者。有可依據。文亦玄奧。以致今之學者。尙爲難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。唯近世朱奉議。多得其意。遂以本仲景之論。而兼諸書之說。作活人書。其言直。其類辯。使後學者易爲尋檢施行。故今之用者多矣。據河間十六卷之言。比時仲景書。尙未分傷寒雜病爲二門也。或金匱玉函經八卷。坊間分作十六卷。亦未可知。故東垣內外

傷辯惑論曰。易張先生云。仲景藥爲萬世法。號羣方之祖。治雜病若神。後之醫者。宗內經法。學仲景心。可以爲師矣。王海藏此事難知云。余讀醫書幾十載矣。所仰慕者。仲景一書爲尤。然讀之未易洞達其趣。欲得一師指之。徧國中無有能知者。故於醫壘元戎云。折中湯液。萬世不易之法。當以仲景爲祖。又云金匱玉函要略。傷寒論。皆張仲景祖神農法。伊尹體箕子而作也。唐宋以來。如孫思邈。葛稚川。朱奉議。王朝奉輩。其餘名醫雖多。皆不出仲景書。又湯液本草於孫葛朱王外。添王叔和范汪胡洽錢仲陽成無已陳無擇云。其議論方定。增減變易。千狀萬態。無有一毫不出於仲景者。潔古張元素。其子張璧。東垣李明之。皆祖張仲景湯液。惜乎世莫有能知者。又云仲景廣湯液爲大法。晉宋以來。號名醫者。皆出於此。又按丹谿局方發揮。或問曰。仲景治傷寒一百一十三方。治雜病。金匱要略二十有三門。何也。答曰。仲景諸方。實萬世醫門之規矩準繩也。後之欲爲方圓平直者。必於是而取則焉。曰。要略之方。果足用乎。曰。天地氣化無窮。人身之病。亦變化無窮。仲景之書。載道者也。醫之良者。引例推類。可謂無窮之應用。借令略有加減修合。終難踰越矩度。又曰。圓機活法。內經具舉。與經意合者。仲景書也。仲景因病以制方。局方製藥以俟病。據數家說。是元末及我國朝初醫家。方分傷寒雜病爲二家也。只因聊攝七十八歲。撰成明理論。八十歲時。注完傷寒論。未暇注金匱論。所以俗醫分爲二門。致今時衆口一辭。謂仲景能治傷寒而不能療雜證也。冤哉。余素慨金匱方論與傷寒論睽離孤處。及注解傷寒論。又明理論。乖散失羣。已近五百年。因謀諸新安師古吳君。校壽一梓。

成濟睽而得會遇。庶業醫者弗致得此失彼。各自專門爲粗陋。又冀華劍復合。昌鏡再圓。天作之合云爾。萬曆戊戌孟夏吉日匿迹市隱逸人謹識。

新編金匱要略方論目錄

卷上

臟腑經絡先後第一

溼喝第二

栝樓桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防已黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

栝樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻鱉甲湯

瘡病第四

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯

柴胡去半夏加栝樓湯

柴胡桂薑湯

中風歷節第五

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

朮附湯

八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

薯蕷圓

酸棗湯

大黃蠱蟲圓

附方

炙甘草湯

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢圓

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯 桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

甘草湯

生薑甘草湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

桔梗白散

葶藶湯

奔豚氣第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

栝樓薤白白酒湯

栝樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂圓

九痛圓

腹滿寒疝宿食第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大建中湯

大黃附子湯

赤圓

烏頭煎

當歸生薑羊肉湯 烏頭桂枝湯

附方

柴胡桂枝湯 走馬湯 瓜蒂散

卷中

五臟風寒積聚第十一

麻子仁圓 甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽第十二

茯苓桂枝白朮甘草湯 甘遂半夏湯

小青龍湯 小青龍湯 十棗湯 朮防已湯

朮防已加茯苓芒消湯 澤瀉湯 厚朴大黃湯

小半夏湯 防已椒目葶藶大黃圓 小半夏加茯苓湯

五苓散

附方

茯苓飲 茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味去桂加乾薑細辛湯 茯苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯

消渴小便利淋第十三

文蛤散

栝樓瞿麥圓

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

越婢湯

防已茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

枳朮湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃消石湯

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃圓

柏葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

豬苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫第十九

梨蘆甘草湯

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅圓

婦人妊娠第二十

附子湯

桂枝茯苓丸

膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

陽旦湯

竹皮大圓

白頭翁加甘草阿膠湯

附方

三物黃芩湯

內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯

甘草小麥大棗湯

溫經湯

土瓜根散

旋復花湯

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

腎氣圓

蛇床子散

狼牙湯

小兒疳虫蝕齒方

雜療第二十三

四時加減柴胡飲

長服訶梨勒圓

三物備急同

紫石寒食飲

救卒死方共五方

救卒死而壯熱方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便者方

救小兒卒死而吐利不知是何病方

治尸蹙方共二方

救卒死客忤方二方

救自縊死方

療中膈方

救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒方

治食鬱肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方二方

治食馬肉中毒欲死方二方

治食噉蛇牛肉欲死方三方

治食牛肉中毒方

治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱸不化成癥病方二方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鱖鰕魚中毒方

治食蠟中毒方二方

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方

治食楓柱菌而哭不止方

治誤食野芋煩毒欲死方

治誤食蜀椒閉口者方

食躁或躁方

治誤食鉤吻殺人解

治誤食水蓂蓉中毒方

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方共二方

貪食食多不消心腹堅滿治之方

通除諸毒藥

大明應天徐鎔按林億序云二十五篇除重複合二百六十二方於是就古本新本篇下所注之數通計之止得二百四十六然菓實菜穀篇下古本新本俱闕注數恐校正時序數如此篇注如彼忽略脫誤也併此脫落一十二首亦僅得二百五十八耳較之猶欠四首及數目錄亦二百五十八其中重出者一十六方脫落者一十九方若腹滿證大承氣湯宿食證却云見前瘵病中水氣篇防已黃耆湯附方後却云見風溼中乃卷內之重也因去之溼證中白朮附子湯中風篇朮附湯八味圓婦

人雜病篇腎氣圓品。味分兩雖同。方名則異。因存之。其厚朴三物湯。厚朴大黃湯。小承氣湯。方名雖異。藥味並同。分兩參差。神妙莫測。非叔和不能集。仲景不能述。又非今世醫者所能驟而窺也。因贊之。若黃連粉。梨蘆甘草湯。附子湯。陽旦湯。膠薑湯。卷注云。雖未見。則照杏子湯目。錄而補之。苦參湯。卷中未注未見。恐校正時誤脫也。因取龐安時及千金等而補附遺。若麻黃杏仁薏苡甘草等湯。一十三方。則據卷中所有而添目錄。以實除重複。合二百六十二方之數也。其寒疝附方烏頭湯。注云。方見上。上係烏頭煎。烏頭桂枝湯。若烏頭湯。載在中風篇。因未覩外臺。只得存其疑也。痰飲篇及婦人雜病篇。小青龍湯。並云見肺癰中。乃是小青龍加石膏湯也。其小青龍湯方。則見咳嗽中。若五勞斷齒等證。形狀病源。間採巢氏病源。另爲一篇。附於卷末。以便初學私淑集注之意也。或曰。林億等校勘。脫誤重複。焉能爲有余曰。活人書。奉議公之手筆也。方尙重複。況此論校者非一人。正者非一手。仲景沒而微言絕。雖有病源千金。辭愈煩而理愈晦。正醫道如縷之秋也。奈校方論時。醫學纔開。胷中無主。又且術業素異。居養不同。或執己私。失於商較。焉知不無差譌哉。余今億度於千載之後。聊附鄙語。以俟明哲。更爲正之。若篇注論幾首。脈證幾條。臺頭高下。有圈無圈。則仍舊本所書云。時萬曆乙酉夏至日識。

○附遺

○苦參湯方見龐安時傷寒總論

狐惑證

苦參半斤

槐白皮

狼牙根各肆兩

右剉。以水伍升。煎三升半。洗之。

○赤小豆當歸散方見麗方時作一兩

當歸兩 千金作三兩

○白虎加桂枝湯方見千金

粳米合二 千金作六合是

○蜀漆散方

蜀漆燒 傷寒論及本草俱作洗是

○續命湯方見玉機微義

川芎兩一

○甘草湯方見千金 治肺痿涎睡多出血心中溫溫液液千金翼名溫液湯

甘草兩二

○桂枝去芍藥加皂莢湯方見千金

大棗枚十五

○赤圓方見千金

附子兩二 射罔如大棗一兩 係六味

○烏頭桂枝湯方見千金

烏頭實中者五枚。除去角。

蜜作一斤

○茯苓戎鹽湯方

右三味闕

○膠艾湯方

見局方

乾地黄兩四

○白朮散方

見局方

白朮

芎藭各四分

牡蠣熬二兩

○小兒疳蟲蝕齒方

雄黃闕 葶藶闕

○治尸蹙方

注脈證見上卷即第三葉問曰寸口脈沉大而滑卒厥證一條。是也。

升合分兩

此經方劑並按古法。錙銖分兩。與今不同。謂如咬咀者。即今之剉如麻豆大是也。云一升者。即今之大白蓋也。云銖者。六銖爲一分。即二錢半也。二十四銖爲一兩也。云三兩者。即今之一兩。云二兩者。即今之六錢半也。料例大者。只合三分之一足矣。

新編金匱要略方論卷上

漢 張仲景述
晉 王叔和集
宋 尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等詮次

○臟腑經絡先後病脈證第一

論十三首

脈證二條

問曰。上工治未病。何也。○師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王。不受邪。即勿補之。中工不曉相傳。見肝之病。不解實脾。惟治肝也。夫肝之病。補用酸。助用焦。苦益用甘。味之藥調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱。則水不行。水不行。則心火氣盛。則傷肺。肺被傷。則金氣不行。金氣不行。則肝氣盛。則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法。實則不在用之。經曰。虛虛實實。補不足。損有餘。是其義也。餘藏準此。

夫人稟五常。因風氣而生長。風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。若五臟元貞通暢。人即安和。客氣邪風。中人多死。千般疢難。不越三條。一者。經絡受邪。入臟腑爲內所因也。二者。四肢九竅。血脈相傳。壅塞不通。爲外皮膚所中也。三者。房室金刃。蟲獸所傷。以凡詳之。病由都盡。若人能養慎。不令邪氣干忤經絡。適中經絡。未流傳入臟。即醫治之。四肢才覺重滯。即導引吐納。鍼灸膏摩。勿令九

竅閉塞。更能無犯王法。禽獸災重。房室勿令竭之。服食節其冷熱苦酸辛甘。不遺形體有衰。病則無由入其腠理。腠者是三焦通會元貞之處。爲血氣所注。理者是皮膚臟腑之文理也。

問曰。病人有氣色。見於面部。願聞其說。師曰。鼻頭色青。腹中痛。若冷者死。一云腹中冷。若痛者死。鼻頭色微黑者。有

水氣。色黃者。胸上有寒。色白者。亡血也。設微赤。非時者死。其目正圓者。病不治。又色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者便難。色鮮明者有留飲。

師曰。病人語聲寂然。喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然不徹者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。腹中病。一作痛。

師曰。息搖肩者。心中堅。息引胸中上氣者。欬。息張口短氣者。肺痿唾沫。

師曰。吸而微數。其病在中焦實也。當下之。卽愈。虛者不治。在上焦者。其吸促。在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者。不治。

師曰。寸口脈動者。因其王時而動。假令肝王。色青。四時各隨其色。肝色青而反色白。非其時。色脈皆當病。

問曰。有未至而至。有至而不至。有至而不去。有至而太過。何謂也。○師曰。冬至之後。甲子夜半。少陽起。少陽之時。陽始生。天得溫和。以未得甲子。天因溫和。此爲未至而至也。以得甲子。而天未溫和。爲至而不至也。以得甲子。而天大寒不解。此爲至而不去也。以得甲子。而天溫如盛夏五六月時。此爲至而太過。

也。

師曰。病人脈浮者。在前其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛背強不能行。必短氣而極也。

問曰。經云。厥陽獨行。何謂也。○師曰。此爲有陽無陰。故稱厥陽。

問曰。寸脈沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實氣相搏。血氣入臟卽死。入腑卽愈。此爲卒厥。何謂也。○師曰。唇口青。身冷爲入臟卽死。如身和汗自出爲入腑卽愈。

問曰。脈脫入臟卽死。入腑卽愈。何謂也。○師曰。非爲一病。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起。流向四肢者。可治。從四肢流來入口者。不可治。病在外者可治。入裏者卽死。

問曰。陽病十八。何謂也。師曰。頭痛項腰痛。脊臂腳掣痛。陰病十八。何謂也。師曰。欬上氣喘噦咽腸鳴。脹滿心痛。拘急。五臟病各有十八。合爲九十病。人又有六微。微有十八病。合爲一百八病。五勞七傷。六極。婦人三十六病。不在其中。清邪居上。濁邪居下。大邪中表。小邪中裏。繫飢之邪。從口入者。宿食也。五邪中人。各有法度。風中於前。寒中於暮。濕傷於下。霧傷於上。風令脈浮。寒令脈急。霧傷皮腠。濕流關節。食傷脾胃。極寒傷經。極熱傷絡。

問曰。病有急當救裏救表者。何謂也。○師曰。病醫下之。續得下利。清穀不止。身體疼痛者。急當救裏。後身體疼痛。清便自調者。急當救表也。○夫病痼疾。加以卒病。當先治其卒病。後乃治其痼疾也。

師曰。五臟病各有得者。愈。五臟病各有所惡。各隨其所不喜者爲病。病者素不應食。而反暴思之。必發。

熱也○夫諸病在藏欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪苓湯餘皆倣此

○瘧濕喝病脈證第二

論一首 脈證十二條 方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧一作瘧餘同

○太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧○太陽病發熱

脈沉而細者名曰瘧爲難治○太陽病發汗太多因致瘧○夫風病下之則瘧復發汗必拘急○瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病也若發其汗者寒溫相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇一云其脈澹澹○暴腹脹大者爲欲解脈如故反伏弦者瘧○夫

瘧脈按之緊如弦直上下行

一作築二而弦

○瘧病有灸瘡難治○脈經云瘧家其脈伏堅直上下

太陽病其證備身體強凡凡然脈反沉遲此爲瘧括蕤桂枝湯主之

○括蕤桂枝湯方

括蕤根 二兩

桂枝 三兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

生姜 三兩

大棗 十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜熱粥發

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之

○葛根湯方

葛根 四兩 麻黃 三兩 桂 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 生姜 三兩 大棗 十二枚

右七味咀咬以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服乙升覆取微似汗

不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌

瘕爲病一本瘕字上有剛字胸滿口噤臥不着席腳攣急必斷齒可與大承氣湯

○大承氣湯方

大黃 四兩 厚朴 半斤 枳實 五枚 芒硝 二合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上大微一二沸分溫再

服得下止服

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細一作緩者此名濕痺玉函云中濕濕痺之候小便不利大便反快但當利其小

便○濕家之爲病一身盡疼一云疼煩發熱身色如熏黃也○濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下

之早則噦或胸滿小便不利一云利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩

也○濕家下之額上汗出微喘小便利一云不利者死若下利不止者亦死○風濕相搏一身盡疼痛法當汗

出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故

不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲出汗者風濕俱去也○濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞

而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈肺經云病人喘而無湯家○濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗爲宜慎不可以大攻之

○麻黃加朮湯方

麻黃三兩
去節

桂枝二兩
去皮

甘草一兩
炙

杏仁七十個
去皮尖

白朮四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

○麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃去節·半兩
湯泡

甘草一兩
炙

薏苡仁半兩

杏仁十個
去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服有微汗避風

風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之

○防已黃耆湯方

防已一兩

甘草半兩
炒

白朮七錢
半

黃耆一兩
一分去蘆

右剉麻豆大每抄五錢七生姜四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服○喘者加麻黃

兩半○胃中不和者加芍藥三分○氣上衝者加桂枝三分○下有陳寒者加細辛三分○服後當如虫行皮中從

腰下如冰。後坐被上。又以一被繞腰下。溫令微汗差。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澀者。桂枝附子湯主之。若大便堅。小便自利者。去桂加白朮湯主之。

○桂枝附子湯方

桂枝四兩 去皮

生姜三兩 切

附子三枚 炮去皮 破八片

甘草二兩 炙

大棗十二枚 擘

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

○白朮附子湯方

白朮二兩

附子一枚半 炮去皮

甘草一兩 炙

生姜半切

大棗六枚

右五味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫三服。一服覺身痺。半日許。再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。卽是朮附並走皮中。逐水氣。未得除故耳。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。

○甘草附子湯方

甘草二兩 炙

附子一枚半 炮去皮

白朮二兩

桂枝四兩 去皮

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗則解。能食。汗出復煩者。服五合。恐

一升多者服六七合爲妙。

太陽中膈發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身卽熱口前門板齒燥若發其汗則其惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之。

○白虎人參湯方

知母六兩 石膏碎一斤

甘草二兩

粳米六合

人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服。

太陽中喝身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物荏蒂湯主之。

○一物荏蒂湯方

瓜蒂二七箇

右剉以水一升煮取五合去滓頓服。

○百合狐惑陰陽毒病證治第三

論一首 證三條 方十二首

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲臥不能臥欲行不能行飲食或有不時或有不時聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形

如和其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。

○百合知母湯方

百合七枚 知母三兩切

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母。取一升。去滓。後合和煎。取一升。五合。分溫再服。

百合病下之後者。滑石代赭湯主之。

○滑石代赭湯方

百合七枚 滑石三兩碎綿裹 代赭石如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭。取一升。去滓。後合和重煎。取一升。五合。分溫服。

百合病吐之後者。用後方主之。

○百合雞子湯方

百合七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升煎取一升。去滓。內雞子黃。攪勻煎五分。溫服。

百合病不經吐下發汗。病形如初者。百合地黃湯主之。

○百合地黃湯方

百合七枚 生地黃汁一升

右以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升煎取一升。去滓。內地黃汁煎取一升。五合。分溫再服。中病勿更服。大便常如漆。

百合病一月不解。變成渴者。百合洗方主之。

○百合洗方

右以百合一升。以水一斗漬之一宿。以洗身。洗已。食煮餅。勿以鹽豉也。

百合病渴不差者。栝樓牡蠣散主之。

○栝樓牡蠣散方

栝樓根 牡蠣熬等分

右爲細末。飲服方寸匕。日三服。

百合病變發熱者。乙作發 百合滑石散主之。

○百合滑石散方

百合炙一兩

滑石三兩

右爲散。飲服方寸匕。日三服。當微利者止服。熱則除。

百合病見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此爲逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦爲逆。

狐惑之爲病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。臥起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。蝕於上部則聲喝。一作甘草瀉心湯主之。

○甘草瀉心湯方

甘草四兩

黃芩

人參

乾姜各三兩

黃連一兩

大棗十二枚

半夏半升

右七味。水一斗。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

蝕於下部則咽乾苦。參湯洗之。

雄黃

右一味爲末。筒瓦二枚合之。燒向肛熏之。

脈經云。病人或從呼吸止。蝕其咽。或從下焦蝕其肛陰。
蝕上爲感。蝕下爲狐。狐惑病者。猪苓散主之。

病者脈數。無熱微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日目四眦。一本此有黃字黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

○赤小豆當歸散方

赤小豆三升。浸冷芽出曝乾。

當歸口口

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

陽毒之爲病。面赤斑斑如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。升麻鱉甲湯主之。
陰毒之爲病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之。

○升麻鱉甲湯方

升麻二兩

當歸一兩

蜀椒

炒去汗一兩

甘草二兩

鱉甲

手指大一片炙

雄黃

半兩研

右六味。以水四升。煮取一升。頓服之。老小再服。取汗。

肘後千金方。陽毒用升麻湯。無鱉甲。有桂。陰毒用甘草湯。無雄黃。

○瘡病脈證并治第四

證二條

方六首

師曰。瘡脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之差。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗。針灸也。浮大

者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。

病瘡以月一日發。當以十五日愈。設不差。當月盡解。如其不差。當云何。師曰。此結爲癰瘕。名曰瘡母。急治之。宜蠶甲煎圓。

○蠶甲煎圓方

蠶甲十一分炙

烏扇三分燒

黃芩三分

柴胡六分

鼠婦三分熬

乾姜三分

大黃三分

芍藥五分

桂枝三分

葶歷一分熬

石韋三分去毛

厚朴三分

牡丹五分去心

瞿麥二分

紫威三分

半夏一分

人參一分

蟬蟲五分熬

阿膠三分炙

蜂窠四分炙

赤消十二分

蜣螂六分熬

桃仁二分

右二十三味爲末。取鍛竈下灰一斗。清酒一斛五斗。浸灰候酒盡一半。着蠶甲於中。煮令泛爛如膠。

漆絞取汁。內諸藥煎爲丸。如梧子大。空心服七丸。日三服。

千金方用蠶甲十二片。又有海藻三分。大戟一分。蜜虫五分。無鼠婦赤消二味。以蠶甲煎和諸藥爲丸。

師曰。陰氣孤絕。陽氣獨發。則熱而少氣。煩冤。手足熱而欲嘔。名曰瘰癧。若但熱不寒者。邪氣內藏於心。外含分肉之間。令人消鑠肌肉。

溫瘧者。其脈如平。身無寒。但熱。骨節疼煩。時嘔。白虎加桂枝湯主之。

○白虎加桂枝湯方

知母 六兩

甘草 二兩

石膏 一斤

粳米 二合

桂 三兩

右剉每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出愈

瘡多寒者名曰牡瘡蜀漆散主之

○蜀漆散方

蜀漆 洗去

雲母 燒二日夜

龍骨 等分

右三味杵爲散未發前以漿水服半錢○溫瘡加蜀漆半分臨發時服一錢匕一方雲母作雲實

附外臺秘要方

○牡蠣湯治牡瘡

牡蠣 熬四兩

麻黃 去節四兩

甘草 二兩

蜀漆 三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

○柴胡去半夏加栝樓湯治瘡病發渴者亦治勞瘡

柴胡 八兩

人參

黃芩

甘草 各三兩

栝樓根 四兩

生姜 二兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

○柴胡桂薑湯治瘡寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神

柴胡 半斤

桂枝 三兩
去皮

乾姜 二兩

栝樓根 四兩

黃芩 三兩

牡蠣 二兩
熬

甘草 二兩
炙

右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

○中風歷節病脈證并治第五

論一首

脈證三條

方十二首

夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲痺。脈微而數。中風使然。○寸口脈浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。喎僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。卽重不勝。邪入於府。卽不識人。邪入於藏。舌卽難言。口吐涎。

○侯氏黑散治大風四肢煩重。心中惡寒不足者。外臺治風顛。

菊花 四十
分

白朮 十分

細辛 三分

茯苓 三分

牡蠣 三分

桔梗 八分

防風 十分

人參 三分

礬石 三分

黃芩 五分

當歸 三分

乾姜 三分

芎藭 三分

桂枝 三分

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日一服。初服二十日。溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷食曰能助藥力。

寸口脈遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。榮緩則爲亡血。衛緩則爲中風。邪氣中經。則身痒而癰疹。心氣不足。

邪氣入中。則胸滿而短氣。

○風引湯除熱癰。

大黃

乾姜

龍骨各四兩

桂枝三兩

甘草

牡蠣各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏各六兩

右十二味。杵麤篩。以韋囊盛之。取三指撮。井花水三升。煮三沸。溫服一升。治大人風引。少小驚癇。瘈瘲。氣宜風引湯。巢氏云。脚。

○防已地黃湯。治病如狂狀。妄行。獨語不休。無寒熱。其脈浮。

防已一分

桂枝三分

防風三分

甘草一分

右四味。以酒一盃。漬之一宿。絞取汁。生地黄二斤。咬咀。蒸之如斗米飯久。以銅器盛其汁。更絞地黄汁。和分再服。

○頭風摩散方

大附子炮一枚

鹽等分

右二味。爲散。沐了。以方寸匕。已摩。痰上。令藥力行。

寸口脈沉而弱。沉卽主骨弱。弱卽主筋沉。卽爲腎弱。卽爲肝汗。出入水中。如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節。映陽脈浮而過滑。則穀氣實。浮則汗自出。

少陰脈浮而弱。弱則血不足。浮則爲風。風血相搏。卽疼痛如掣。盛人脈濇小。短氣血汗出。歷節疼。不可屈伸。此皆飲酒汗出。當風所致。諸肢節疼痛。身體尪羸。腳腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。

○桂枝芍藥知母湯方

桂枝 四兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

麻黃 二兩

生姜 五兩

白朮 五兩

知母 四兩

防風 四兩

附子 炮 二兩

右九味。以水七升。煮取二升。溫服七合。日三服。

味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛俱微。三焦無所御。四屬斷絕。身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便爲歷節也。病歷節。不可屈伸。疼痛。烏頭湯主之。

○烏頭湯方 治腳氣疼痛。不可屈伸。

麻黃

芍藥

黃芪

各三兩

甘草 炙

川烏

五枚。咬咀。以蜜二升。煎取一升。卽出烏頭。

右五味。咬咀。四味。以水三升。煮取一升。去滓。內蜜煎中。更煎之。服七合。不知。盡服之。

○礬石湯 治腳氣衝心

礬石 二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸腳良。

附方

○古今錄驗續命湯

治中風痲身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側姚云與大

兼治婦人產後去血者及老人小兒。

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾姜

甘草

各三兩

芍藥

杏仁

四十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風。

并治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫。

○千金三黃湯

治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食。

麻黃

五分

獨活

四分

細辛

二分

黃蘗

二分

黃芩

三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣

逆加人參三分悸加牡蠣三分渴加栝樓根三分先有寒加附子一枚。

○近効方朮附湯

治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣。

白朮二兩

附子一枚上炮去皮

甘草一兩炙

右三味剉每五錢匕姜五片棗一枚水盞半煎七分去滓溫服。

○崔氏八味丸 治腳氣上入少腹不仁。

乾地黃兩^八

山茱萸

薯蕷^{各四兩}

澤瀉

茯苓

牡丹皮^{各三兩}

桂枝

附子^{炮各一兩}

右八味末之。煉蜜和丸。梧子大。酒下十五丸。日再服。

○千金方。越婢加朮湯。治肉極熱。則身體津脫。腠理開。汗大泄。厲風氣。下焦腳弱。

麻黃六兩

石膏^{半斤}

生姜二兩

甘草二兩

白朮^{四兩}

大棗^{十五枚}

右六味。以水六升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。○惡風加附子一枚。^炮

○血痺虛勞病脈證并治第六

論一首

脈證九條

方九首

問曰。血痺病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。重因疲勞。汗出。臥不時動搖。加被微風。遂得之。但以脈自微。濇在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣。令脈和緊去則愈。血痺陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。黃耆桂枝五物湯主之。

○黃耆桂枝五物湯方

黃耆三兩

芍藥三兩

桂枝三兩

生姜六兩

大棗^{十二枚}

右五味。以水六升。煮取二升。溫服七合。日三服。^{一方有人參。}

夫男子平人脈大爲勞極虛亦爲勞。○男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也。○男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此爲勞使之然。○勞之爲病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘳陰寒精自出酸削不能行。○男子脈浮弱而濇爲無子精氣清冷一作冷。○夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩一作目眩髮落脈極虛芤遲爲清穀亡血失精脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之。

○桂枝加龍骨牡蠣湯方小品云：虛弱浮熱汗出者，餘桂加白薇附子各三分，故曰二加龍骨湯。

桂枝

牡蠣各三兩

芍藥

生姜各三兩

甘草二兩

大棗十二枚

龍骨

右七味以水七升煮取三升分溫三服。

○天雄散方

天雄三兩炮

白朮八兩

桂枝六兩

龍骨三兩

右四味杵爲散酒服半錢七日三服不知稍增之。

男子平人脈虛弱細微者喜盜汗也。○人年五六十其病脈大者痺俠背行若腸鳴馬刀俠癭者皆爲勞得之。○脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也。○脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精。

虛勞裏急悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。

○小建中湯方

桂枝 三兩 去皮

甘草 三兩 炙

大棗 十二枚

芍藥 六兩

生姜 三兩

膠飴 一升

右六味以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用建中。

千金療男女因積冷氣滯。或大病後不復。常苦四肢沉重。骨肉痠疼。吸吸少氣。行動喘乏。胸滿氣急。腰背強痛。心中虛悸。咽乾唇燥。面體少色。或飲食無味。腎膀胱脹。頭重不舉。多臥少起。甚者積年。輕者百日。漸致瘦弱。五藏氣竭。則難可復常。六脈俱不足。虛寒乏氣。少腹拘急。羸瘠百病。名曰黃耆建中湯。又有人參二兩。

虛勞裏急。諸不足。黃耆建中湯主之。於小建中湯內加黃耆一兩半。餘依上法。○氣短胸滿者。加生姜。虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利者。八味腎氣圓主之。方見婦人。虛勞諸不足。風氣百疾。薯蕷圓主之。

○薯蕷丸方

薯蕷 三十 分

當歸

桂枝

麴

乾地黄

豆黃卷 各十 分

甘草 二十 分

人參 十分

芎藭

芍藥

白朮

麥門冬

杏仁 各六 分

柴胡

桔梗

茯苓 各五 分

阿膠 七分

乾姜 三分

白歛 二分

防風 六分

大棗 百枚 爲膏

右二十一味。末之。煉蜜和丸如彈子大。空腹酒服一丸。一百丸爲劑。

虛勞虛煩不得眠。酸棗湯主之。

○酸棗湯方

酸棗仁^{二升}

甘草^{一兩}

知母^{二兩}

茯苓^{二兩}

芎藭^{二兩}

○^{深師有生}姜^{二兩}

右五味以水八升。煮酸棗仁得六升。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

五勞虛極。羸瘦腹滿。不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。饑傷。勞傷。經絡榮衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。大黃廬蟲圓主之。

○大黃廬蟲丸方

大黃^{十分}

黃芩^{二兩}

甘草^{三兩}

桃仁^{一升}

杏仁^{一升}

芍藥^{四兩}

乾地黄^{十兩}

乾漆^{一兩}

蠱蟲^{一升}

水蛭^{百枚}

蟻螬^{一升}

廬蟲^{半升}

右十二味末之。煉蜜和丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。

附方

○千金翼炙甘草湯^{一云復脈湯}

治虛勞不足。汗出而悶。脈結悸。行動如常。不出百日。危急者十一日死。

甘草^{四兩}

桂枝^{三兩}

生姜^{各三兩}

麥門冬^{半升}

麻仁^{半升}

人參

阿膠^{各二兩}

大棗^{三十枚}

生地黃^{一斤}

右九味以酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠消盡。溫服一升。日三服。

○肘後癰肝散治冷勞又主鬼疰一門相染

癰肝一具炙乾末之水服方寸七日三服

○肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七

論三首 脈證四條 方十五首

問曰熱在上焦者因欬爲肺痿肺痿之病從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又或快藥下利重亡津液故得之曰寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者何師曰爲肺痿之病若口中辟辟燥欬卽胸中隱隱痛脈反滑數此爲肺癰欬唾膿血脈數虛者爲肺痿數實者爲肺癰○問曰病欬逆脈之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脈微而數微則爲風數則爲熱熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血爲之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可掬膿成則死○上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加利尤甚○上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之若以湯已渴者屬消渴

○甘草乾姜湯方

甘草

炙四兩

乾姜

炮二兩

右咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。
欬而上氣。喉中水雞聲。射干麻黃湯主之。

○射干麻黃湯方

射干 十三枚。一法三兩。

麻黃 四兩

生姜 四兩

細辛

紫苑

款冬花 各三兩

五味子 半升

大棗 七枚

半夏 大者洗八枚。一法半升。

右九味。以水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。
欬逆上氣。時時唾濁。但坐不得眠。皂莢圓主之。

○皂莢丸方

皂莢 八兩。刮去皮。用酥炙。

右一味。末之。蜜丸梧子大。以棗膏和湯服三丸。日三夜一服。
欬則脈浮者。厚朴麻黃湯主之。

○厚朴麻黃湯方

厚朴 五兩

麻黃 四兩

石膏 如雞子大

杏仁 半升

半夏 半升

乾姜 二兩

細辛 二兩

小麥 一升

五味子 半升

右九味。以水一斗二升。先煮小麥熟。去滓。內諸藥。煮取三升。溫服一升。日三服。

脈沉者澤漆湯主之。

○澤漆湯方

半夏半升

紫參五兩·一作紫苑·

澤漆三斤·以東流水五斗·煮取一斗五升·

生姜五兩

白前五兩

甘草

黃芩

人參

桂枝各三

右九味咬咀。內澤漆汁中。煮取五升。溫服五合。至夜盡。

大逆上氣。咽喉不利。止逆下氣者。麥門冬湯主之。

○麥門冬湯方

麥門冬七升

半夏一升

人參二兩

甘草二兩

粳米三合

大棗十二枚

右六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。日三夜一服。

肺癰喘不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。

○葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶熬令黃色·搗丸如彈子大·

大棗十二枚

右先以水三升。煮棗取二升。去棗。內葶藶。煮取一升。頓服。

欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗湯主之。

○桔梗湯方 亦治血痺。

桔梗一兩 甘草二兩

右二味以水三升。煮取一升。分溫再服。則吐膿血也。

欬而上氣。此爲肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。越婢加半夏湯主之。

○越婢加半夏湯方

麻黃六兩 石膏半斤 生姜三兩 大棗十五枚 甘草二兩 半夏半升

右六味以水六升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

肺脹欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青龍加石膏湯主之。

○小青龍加石膏湯方 千金證治同。外更加臍下痛引缺盆。

麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草 乾姜 各三兩

五味子 半夏 各半升 石膏二兩

右九味以水一斗。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取三升。強人服一升。羸者減之。日三服。小兒服四合。

附方

○外臺炙甘草湯。治肺痿涎睡多。心中溫溫液液者。 方見虛勞中。

○千金甘草湯

甘草

右一味。以水三升。煮減半。分溫三服。

○千金生姜甘草湯。治肺痿欬唾。涎沫不止。咽燥而渴。

生姜 五兩

人參 三兩

甘草 四兩

大棗 十五枚

右四味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

○千金桂枝去芍藥加皁莢湯。治肺痿吐涎沫。

桂枝

生姜 各三兩

甘草 二兩

大棗 十枚

皁莢 乙枚去皮炙焦

右五味。以水七升。微微火煮。取三升。分溫三服。

○外臺桔梗白散。治欬而胸滿振寒。脈數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。

桔梗

貝母 各三分

巴豆 一分去皮熬研如脂

右三味。爲散。強人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者。吐膿血。膈下者瀉出。若下多不止。飲冷水一

杯則定。

○千金葦莖湯。治欬有微熱煩滿。胸中甲錯。是爲肺癰。

葦莖 二升

薤白 仁半升

桃仁 五十枚

瓜瓣 半升

右四味。以水一斗。先煮葦莖得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。服一升。再服。當吐如膿。

肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞清涕出。不聞香臭酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。見方

上・三日一劑・可至三四劑・此先服小青龍湯一劑・乃進・小青龍方見欬嗽門中・

○奔豚氣病脈證治第八

論二首 方三首

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

○奔豚湯方

甘草

芎藭

當歸 各二兩

半夏 四兩

黃芩 二兩

生葛 五兩

芍藥 二兩

生姜 四兩

甘李根白皮 一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發賁豚氣從少腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之

○桂枝加桂湯方

桂枝 五兩

芍藥 三兩

甘草 二兩炙

生姜 三兩

大棗 十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓溫服一升

發汗後臍下悸者。欲作賁豚。伏苓桂枝甘草大棗湯主之。

○茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤 甘草 炙 二兩 大棗 枚 十五 桂枝 四兩

右四味。以甘爛水一斗。先煮茯苓。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。
以杓揚之。水上珠子五六千顆相逐。取用之。 甘爛水法。取水二斗。置大盆內。

○胸痺心痛短氣病脈證治第九

論一首 證一首 方十首

師曰。夫脈當取太過不及。陽微陰弦。即胸痺而痛。所以然者。責其極虛也。今陽虛知在上焦。所以胸痺心痛者。以其陰弦故也。○平人無寒熱短氣。不足以息者。實也。

胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脈沉而遲。關上小緊數。栝樓薤白白酒湯主之。

○栝樓薤白白酒湯方

栝樓實 一枚 薤白 半斤 白酒 七升

右三味。同煮取二升。分溫再服。

胸痺不得臥。心痛徹背者。栝樓薤白半夏湯主之。

○栝樓薤白半夏湯方

栝樓實一枚

薤白三兩

半夏半斤

白酒一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心中痞氣氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

○枳實薤白桂枝湯方

枳實四枚

厚朴四兩

薤白半斤

桂枝一兩

栝樓實一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

○人參湯方

人參

甘草

乾姜

白朮各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳薑湯亦主之

○茯苓杏仁甘草湯方

茯苓三兩

杏仁五十箇

甘草一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差更服

○橘皮枳實生薑湯方

橘皮一斤

枳實三兩

生薑半斤

右三味以水五升。煮取二升。分溫再服。肘後千金云。治胸痺。胸中痞滿如滿。胸痺緩急者。薏苡人附子散主之。

○薏苡附子散方

薏苡仁兩十五 大附子十枚

右二味。杵爲散。服方寸匕。日三服。

心中痞。諸逆心懸痛。桂枝生薑枳實湯主之。

○桂枝生薑枳實湯方

桂枝 生姜各三兩 枳實五枚

右三味。以水六升。煮取三升。分溫三服。

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂圓主之。

○赤石脂丸方

蜀椒一兩一分 烏頭一分 附子半兩一分 乾姜一兩一分 赤石脂一兩一分

右五味。末之。蜜丸如梧子大。先食服一九。日三服。不知。稍加服。

○九痛丸治九種心痛

附子三兩 生狼牙一兩 巴豆一兩去皮心 人參 乾姜 吳茱萸各一兩

右六味末之。煉蜜丸如梧子大。酒下。強人初服三九。日三服。弱者二九。○兼治卒中惡。腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。并冷衝上氣。落馬墜車血疾等。皆主之。忌口如常法。

○腹滿寒疝宿食病脈證治第十

論一首

脈證十六條

方十三首

跌陽脈微弦。法當腹滿。不滿者。必便難。兩胠疼痛。此虛寒從下上也。當以溫藥服之。○病者腹滿。按之不痛爲虛。痛者爲實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。○腹滿時減復如故。此爲寒。當與溫藥。○病者瘳黃。躁而不渴。胸中寒。實而利不止者死。○寸口脈弦者。卽脇下拘急而痛。其人嗇嗇惡寒也。○夫中寒家喜欠。其人清涕出。發熱色和者。善噓。○中寒其人下利。以裏虛也。欲噓不能。此人肚中寒。痛。○夫瘦人繞臍痛。必有風冷。穀氣不行而反下之。其氣必衝。不衝者。心下則痞。病腹滿。發熱十日。脈浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之。

○厚朴七物湯方

厚朴 半斤

甘草

大黃 兩 各三

大棗 十枚

枳實 五枚

桂枝 二兩

生姜 五兩

右七味。以水一斗。煮取四升。溫服八合。日三服。○嘔者加半夏五合。○下利去大黃。○寒多者加生姜至半斤。

腹中寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐。附子粳米湯主之。

○附子粳米湯方

附子炮一枚

半夏半升

甘草一兩

大棗十枚

粳米半升

右五味以水八升。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

痛而閉者。厚朴三物湯主之。

○厚朴三物湯方

厚朴八兩

大黃四兩

枳實五枚

右三味以水一斗二升。先煮二味。取五升。內大黃。煮取三升。溫服一升。以利爲度。按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。宜大柴胡湯。

○大柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩三兩

芍藥三兩

半夏半升洗

枳實四枚炙

大黃二兩

大棗十二枚

生姜五兩

右八味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大承氣湯。

○大承氣湯方見前症病中。

心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒。上衝皮起出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

○大建中湯方

蜀椒二合
去汗

乾姜 四兩

人參 二兩

右三味。以水四升。煮取二升。去滓。內膠飴一升。微火煎取一升半。分溫再服。如一炊頃。可飲粥二升。後更服。當一日食糜。溫覆之。

脇下偏痛發熱。其脈緊弦。此寒也。以溫藥下之。宜大黃附子湯。

○大黃附子湯方

大黃 三兩

附子 炮三枚

細辛 二兩

右三味。以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人。煮取二升半。分溫三服。服後如人行四五里。進一服。寒氣厥逆。赤圓主之。

○赤丸方

茯苓 四兩

半夏 四兩洗。一
方用桂。

烏頭 炮二兩

細辛 一兩一作人參。
千金。

右六味。末之。內真朱爲色。煉蜜丸如麻子大。先食酒飲下三丸。日再夜一服。不知。稍增之。以知爲度。腹痛脈弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。卽爲寒疝。寒疝遶臍痛苦。發則白津出。手足厥冷。其脈沉緊者。大烏頭煎主之。

○烏頭煎方

烏頭大者五枚。熬去皮。不喫咀。

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水氣盡。取二升。強人服七合。弱人服五合。不差。明日更服。不可一日再服。

寒疝腹中痛。及脇痛裏急者。當歸生薑羊肉湯主之。

○當歸生薑羊肉湯方

當歸 三兩 生薑 五兩 羊肉 一斤

右三味。以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加橘皮二兩。白朮一兩。加生薑者。亦加水五升。煮取三升二合服之。

寒疝腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。抵當烏頭桂枝湯主之。

○烏頭桂枝湯方

烏頭

右一味。以蜜二斤。煎減半。去滓。以桂枝湯五合解之。令得一升。後初服二合。不知。卽服三合。又不知。復加至五合。其知者如醉狀。得吐者爲中病。

○桂枝湯方

桂枝 三兩 去皮

芍藥 三兩

甘草 二兩 炙

生姜 三兩

大棗 十二枚

右五味。剉。以水七升。微火煮取三升。去滓。

其脈數而緊。乃弦狀如弓弦。按之不移。脈數弦者。當下其寒。脈緊大而遲者。必心下堅。脈大而緊者。陽中有陰。可下之。

附方

○外臺烏頭湯。治寒疝腹中絞痛。賊風入攻。五臟拘急。不得轉側。發作有時。使人陰縮。手足厥逆。上方見

○外臺柴胡桂枝湯方。治心腹卒中痛者。

柴胡 四兩

黃芩

人參

芍藥

桂枝

生姜 各一兩半

甘草 乙兩

半夏 二合 半

大棗 六枚

右九味。以水六升。煮取三升。溫服一升。日三服。

○外臺走馬湯。治中惡心痛腹脹。大便不通。

巴豆 二枚 去皮心熬

杏仁 二枚

右二味。以綿纏槌令碎。熱湯二合。捻取白汁。飲之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊病。

問曰。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脈浮而大。按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。大承氣湯主之。○脈數而滑者。實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。○下利不欲食者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

○大承氣湯方見前瘕病中。

宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散。

○瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黃

赤小豆二分煮

右二味杵爲散以香豉七合煮取汁和散一錢匕溫服之不吐者少加之以快吐爲度而止者亡血及嘔與之不可

脈緊如轉索無常者有宿食也○脈緊頭痛風寒腹中有宿食不化也一云寸口脈緊

新編金匱要略方論卷中

○五臟風寒積聚病脈證并治第十一

論二首

脈證十七條

方二首

肺中風者。口燥而喘。身運而重。胃而腫脹。○肺中寒。吐濁涕。○肺死藏浮之虛。按之弱如葱葉。下無根者死。

肝中風者。頭目瞤。兩脅痛。行常偃。令人嗜甘。○肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜太息。胸中痛。不得轉側。食則吐而汗出也。脈經千金云。時盜汗。款。食已吐其汁。○肝死藏浮之弱。按之如索不來。或曲如蛇行者死。○肝着。其人常欲

蹈其胸上。先未苦。時但欲飲熱。旋復花湯主之。臣億等校者本旋復花湯。皆同。

心中風者。翕翕發熱。不能起。心中飢。食即嘔吐。○心中寒者。其人苦病。心如噉蒜狀。劇者心痛徹背。背痛徹心。譬如蠱注。其脈浮者。自吐乃愈。○心傷者。其人勞倦。即頭面赤而下重。心中痛而自煩。發熱。當臍跳。其脈弦。此爲心臟傷所致也。○心死藏浮之實如丸豆。按之益躁疾者死。○邪哭。使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人則畏。合目欲眠。夢遠行而精神離散。魂魄妄行。陰氣衰者爲癰。陽氣衰者爲狂。

脾中風者。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮目瞤瞤而短氣。○脾死藏浮之大堅。按之如覆盂。潔潔狀如

搖者死。臣億等計五藏各有中風中寒。今脾只載中風。腎中風中寒俱不載者。以古文簡亂極多。去古既遠。無文可以補綴也。

跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則堅。其脾爲約。麻子仁圓主之。

○麻子仁丸方

麻子仁二升 芍藥半斤 枳實一斤 大黃一斤 厚朴尺 杏仁升

右六味末之。煉蜜和丸。梧子大。飲服十丸。日三。以知爲度。

腎著之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣表一作裏冷溼。久久得之。腰以下冷痛。腹重如帶五千錢。甘薑苓朮湯主之。

○甘草乾姜大苓白朮湯方

甘草 白朮各二兩 乾姜 茯苓各四兩

右四味。以水五升。煮取三升。分溫三服。腰中卽溫。

腎死藏浮之堅。按之亂如轉丸。益下入尺中者死。

問曰。三焦竭部。上焦竭。善噫。何謂也。師曰。上焦受中焦氣未和。不能消穀。故能噫耳。下焦竭。卽遺溺失便。其氣不和。不能自禁。制不須治。久則愈。

師曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。熱在中焦者。則爲堅。熱在下焦者。則尿血。亦令淋祕不通。大腸有寒者多驚澹。有熱者便腸垢。小腸有寒者。其人下重便血。有熱者必痔。

問曰。病有積有聚。有繫氣。何謂也。師曰。積者藏病也。終不移。聚者府病也。發作有時。展轉痛移。爲可治。繫氣者脅下痛。按之則愈。復發爲繫氣。諸積大法。脈來細而附骨者。乃積也。寸口積在胸中。微出寸口。積在喉中。關上積在臍旁。上關上。積在心下。微下關。積在少腹。尺中積在氣衝。脈出左。積在左。脈出右。積在右。脈兩出。積在中央。各以其部處之。

○痰飲欬嗽病脈證并治第十二

論一首

脈證二十一條

方十九首

問曰。夫飲有四。何謂也。師曰。有痰飲。有懸飲。有溢飲。有支飲。○問曰。四飲何以爲異。師曰。其人素盛今瘦。水走腸間。漚漚有聲。謂之痰飲。飲後水流在脅下。欬唾引痛。謂之懸飲。飲水流行。歸於四肢。當汗出而不汗出。身體疼重。謂之溢飲。欬逆倚息。氣短不得臥。其形如腫。謂之支飲。○水在心。心下堅築。短氣惡水。不欲飲。○水在肺。吐涎沫。欲飲水。○水在脾。少氣身重。○水在肝。脅下支滿。噎而痛。○水在腎。心下悸。○夫心下有留飲。其人背寒冷如水大。○留飲者。脅下痛引缺盆。欬則輒已。一作轉甚○胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脈沉者。有留飲。○膈上病。痰滿喘欬吐。發則寒熱背痛腰疼。目泣自出。其人振振身瞤劇。必有伏飲。○夫病人飲水多。必暴喘滿。凡食少飲多。水停心下。甚者則悸。微者短氣。脈雙弦者。寒也。皆大下後喜虛。脈偏弦者。飲也。○肺飲不弦。但苦喘短氣。○支飲亦喘而不能臥。加短氣。其脈平也。○病痰飲者。當以溫藥和之。

心下有痰飲。胸脅支滿目眩。苓桂朮甘草湯主之。

○茯苓桂枝白朮甘草方

茯苓四兩 桂枝 白朮各三兩 甘草二兩

右四味。以水六升。煮取三升。分溫三服。小便則利。

夫短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘草湯主之。方見婦人雜病中。

病者脈伏。其人欲自利。利反快。雖利心下續堅滿。此爲留飲。欲去故也。甘遂半夏湯主之。

○甘遂半夏湯方

甘遂大者三枚 半夏十二枚。以水一升。煮取半升。去滓。 芍藥五枚 甘草如指大一枚炙。一本作无。

右四味。以水二升。煮取半升。去滓。以蜜半升。和藥汁煎取八合。頓服之。

脈浮而細滑傷飲。○脈弦數有寒飲。冬夏難治。○脈沉而弦者。懸飲內痛。○病懸飲者。十棗湯主之。

○十棗湯方

芫花熬 甘遂 大戟各等分

右三味。搗篩。以水一升五合。先煮肥大棗十枚。取八合。去滓。內藥末。強人服一錢匕。羸人服半錢。平

旦溫服之。不下者。明日更加半錢。得快之後。糜粥自養。

病溢飲者。當發其汗。大青龍湯主之。○小青龍湯亦主之。

○大青龍湯方

麻黃六兩
去節

桂枝二兩
去皮

甘草二兩
炙

杏仁四十箇
去皮尖

生姜三兩

大棗十二枚

石

膏如雞子
大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗多者溫粉粉之

○小青龍湯方

麻黃三兩
去節

芍藥三兩

五味子半升

乾姜三兩

甘草三兩
炙

細辛三兩

桂枝三兩
去皮

半夏半升
湯洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

○木防已湯方

木防已三兩

石膏十二枚
雞子大

桂枝二兩

人參四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

○木防已加茯苓芒硝湯方

木防已 桂枝各二兩 人參 芒硝合三 茯苓各四兩

右五味以水六升。煮取二升。去滓。內芒硝。再微煎。分溫再服。微利則愈。心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之。

澤瀉湯方

澤瀉五兩 白朮二兩

右二味以水二升。煮取一升。分溫再服。

支飲胸滿者。厚朴大黃湯主之。

○厚朴大黃湯方

厚朴尺一 大黃六兩 枳實四枚

右三味以水五升。煮取二升。分溫再服。

支飲不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。方見肺癰中

嘔家本渴。渴者爲欲解。今反不渴。心下有支飲故也。小半夏湯主之。千金云小半夏加茯苓湯

○小半夏湯方

半夏一升 生姜半斤

右二味以水七升。煮取一升半。分溫再服。

腹滿口舌乾燥。此腸間有水氣。已椒歷黃圓主之。

○防已椒目葶藶大黃圓方

防已 椒目 葶藶熬 大黃各一兩

右四味。末之。蜜丸如梧子大。先食飲服一九。日三服。稍增。口中有津液。渴者加芒硝半兩。卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。半夏加茯苓湯主之。

○小半夏加茯苓湯方

半夏升一 生姜半斤 茯苓三兩一分

右三味。以水七升。煮取一升五合。分溫再服。

假令瘦人。臍下有悸。吐涎沫而癰眩。此水也。五苓散主之。

○五苓散方

澤瀉一分 猪苓三分 茯苓三分 白朮三分 桂二分
去皮

右五味。爲末。白飲服方寸匕。日三服。多飲暖水。汗出愈。

附方

○外臺茯苓飲。治心胸中有停痰宿水。自吐出水後。心胸間虛氣滿不能食。消痰氣令能食。

茯苓 人參 白朮各三兩 枳實二兩 橘皮二兩 生姜四兩

右六味水六升。煮取一升八合。分溫三服。如人行八九里進之。

欬家其脈弦。爲有水。十棗湯主之。上方見上

夫有支飲家。欬煩。胸中痛者。不卒死。至一百日。或一歲。宜十棗湯。上方見上

久欬數歲。其脈弱者。可治。實大數者死。其脈虛者必苦冒。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。

欬逆倚息。不得臥。小青龍湯主之。上方見上

青龍湯下已多唾。口燥。寸脈沉。尺脈微。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝。

○桂苓五味甘草湯方

茯苓兩四

桂枝兩四
去皮

甘草兩三

五味子半升

右四味。以水八升。煮取三升。去滓。分溫三服。

衝氣卽低而反更欬。胸滿者。用桂苓五味甘草湯。去桂加乾薑細辛。以治其欬滿。

○苓甘五味姜辛湯方

茯苓兩四

甘草

乾姜

細辛各三兩

五味半升

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服半升。日三。

欬滿卽止。而更復渴。衝氣復發者。以細辛乾姜爲熱藥也。服之當遂渴。而渴反止者。爲反飲也。支飲者。

法當冒。冒者必嘔。嘔者復內半夏以去其水。

○桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯方

茯苓兩_四

甘草

細辛

乾姜兩_{各二}

五味

半夏升_{各半}

右六味以水八升。煮取三升。去滓溫服半升。日三。

水去嘔止。其人形腫者。加杏仁主之。其證應內麻黃。以其人遂痺。故不內之。若逆而內之者必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。

○苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯方

茯苓兩_四

甘草兩_三

五味升_半

乾姜兩_三

細辛兩_三

半夏升_半

杏仁升_半
皮尖去

右七味以水一斗。煮取三升。去滓溫服半升。日三。

若面熱如醉。此爲胃熱。上衝熏其面。加大黃以利之。

○苓甘五味加薑辛半夏大黃湯方

茯苓兩_四

甘草兩_三

五味升_半

乾姜兩_三

細辛兩_三

半夏升_半

杏仁升_半

大黃兩_三

右八味以水一斗。煮取三升。去滓溫服半升。日三。

先渴後嘔。爲水停心下。此屬飲家。小半夏茯苓湯主之。_{方見上}

○消渴小便利淋病脈證并治第十三

脈證九條

方六首

厥陰之爲病。消渴。氣上衝心。心中疼熱。飢而不欲食。食即吐衄。下之不肯止。○寸口脈浮而遲。浮即爲虛。遲即爲勞。虛則衛氣不足。勞則榮氣竭。跌陽脈浮而數。浮即爲氣。數即消穀而大堅。一作緊氣盛則溲數。溲數即堅。堅數相搏。即爲消渴。

男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便一斗。腎氣圓主之。方見婦人雜病中。

脈浮小便不利。微熱消渴者。宜利小便。發汗。五苓散主之。

渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。方見上渴欲飲水不止者。文蛤散主之。

○文蛤散方

文蛤伍兩

右一味。杵爲散。以沸湯五合。和服方寸匕。

淋之爲病。小便如粟狀。小腹弦急。痛引臍中。○跌陽脈數。胃中有熱。即消穀引食。大便必堅。小便即數。○淋家不可發汗。發汗則必便血。

小便不利者。有水氣。其人苦渴。栝樓瞿麥圓主之。

○栝樓瞿麥丸方

栝樓根二兩

茯苓

薯蕷各三兩

附子炮一枚

瞿麥一兩

右五味末之。煉蜜丸。梧子大。飲服三九。日三服。不知。增至七八九。以小便利。腹中溫爲知。小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯並主之。

蒲灰散方

蒲灰七分

滑石三分

右二味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

○滑石白魚散方

滑石二分

亂髮二分

白魚二分

右三味。杵爲散。飲服半錢匕。日三服。

○茯苓戎鹽湯方

茯苓半斤

白朮二兩

戎鹽彈丸大
一枚

右三味

渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎助參湯主之。方見中

脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。

○豬苓湯方

豬苓去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉各口

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠洋消溫服七合日三服

○水氣病脈證并治第十四

論七首

脈證五條

方九首

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證
附腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不
喘黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿○脈浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相
搏風強則爲隱疹身體爲痒痒爲泄風久爲痼癩氣強則爲水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈
惡風則虛此爲風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此爲黃汗○寸口脈沉滑者中有水氣面
目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷不起者
風水○太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此爲風水惡寒者
此爲極虛發汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不得眠
此爲黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此爲脾脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆
不可發汗○裏水者一身面□□腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越
婢加朮湯主之_{方見中風}○跌陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之下之即胸滿短氣○跌陽
脈當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水○寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛

相搏。名曰沈。跌陽脈浮而數。浮脈卽熱。數脈卽止。熱止相搏。名曰伏。沈伏相搏。名曰水。沈則絡脈虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。卽爲水矣。○寸口脈弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。水不沾流。走於腸間。○少陰脈緊而沈。緊則爲痛。沈則爲水。小便卽難。脈得諸沈。當責有水。身體腫重。水病脈出者死。○夫水病人。目下有臥蠅。面目鮮澤。脈伏。其人消渴。病水腹大。小便不利。其脈沉絕者。有水。可下之。

問曰。病下利後。渴飲水。小便不利。腹滿因腫者。何也。答曰。此法當病水。若小便自利及汗出者。自當愈。○心水者。其身重而少氣。不得臥。煩而躁。其人陰腫。○肝水者。其腹大。不能自轉側。脅下腹痛。時時津液微生。小便續通。○肺水者。其身腫。小便難。時時鴨溇。○脾水者。其腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。○腎水者。其腹大臍腫。腰痛不得溺。陰下溼。如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。○師曰。諸有水者。腰以下腫。當利小便。腰以上腫。當發汗乃愈。○師曰。寸口脈沉而遲。沉則爲水。遲則爲寒。寒水相搏。跌陽脈伏。水穀不化。脾氣衰則驚漇。胃氣衰則身腫。少陽脈卑。少陰脈細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經爲血。血不利則爲水。名曰血分。

問曰。病者苦水。面目身體四肢皆腫。小便不利。脈之不言水。反言胸中痛。氣上衝咽。狀如炙肉。當微欬喘。審如師言。其脈何類。師曰。寸口脈沈而緊。沈爲水。緊爲寒。沈緊相搏。結在關元。始時當微。年盛不覺。陽衰之後。榮衛相干。陽損陰盛。結寒微動。腎氣上衝。喉咽塞噎。脅下急痛。醫以爲留飲而大下之。氣擊不去。其病不除。後重吐之。胃家虛煩。咽燥欲飲水。小便不利。水穀不化。面目手足浮腫。又與苓瀉圓下水。當時如

小差。食飲過度。腫復如前。胸脅苦痛。象若奔馳。其水揚溢。則浮咳喘逆。當先攻擊衛氣。令止。乃治欬。欬止。其喘自差。先治新病。病當在後。

風水脈浮。身重汗出惡風者。防已黃耆湯主之。腹痛者加芍藥。

○防已黃耆湯方

方見溼病中。

風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。

○越婢湯方

麻黃六兩

石膏半斤

生姜三兩

甘草二兩

大棗十五枚

右五味。以水六升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

惡風者。加附子一枚。炮

風水。加朮四兩。古今錄驗

皮水爲病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防已茯苓湯主之。

○防已茯苓湯方

防已三兩

黃耆三兩

桂枝三兩

茯苓六兩

甘草二兩

右五味。以水六升。煮取二升。分溫三服。

裏水越婢加朮湯主之。甘草麻黃湯亦主之。

○越婢加朮湯方

見上。於內加白朮四兩。又見中風中。

○甘草麻黃湯方

甘草兩 麻黃兩四

右二味。以水五升。先煮麻黃。去上沫。內甘草。煮取三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再服。慎風寒。水之爲病。其脈沉小。屬少陰。浮者爲風。無水虛脹者爲氣。水發其汗卽已。脈沉者宜麻黃附子湯。浮者宜杏子湯。

○麻黃附子湯方

麻黃兩三 甘草兩二 附子炮一枚

右三味。以水七升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取二升半。溫服八分。日三服。

○杏子湯方

未見。恐是麻黃杏仁甘草石膏湯。

厥而皮水者。蒲灰散主之。方見消渴中。

問曰。黃汗之爲病。身體腫重。一作

發熱。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣色正黃如蘗汁。脈自沉。何從得之。師曰。以汗出入水中。浴水從汗孔入得之。宜耆芍桂酒湯主之。

○黃耆芍藥桂枝苦酒湯方

黃耆五兩

芍藥三兩

桂枝三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以

苦酒阻故也一方用美酒
鹽代苦酒

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞶瞶即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髀弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩燥小便不利此爲黃汗桂枝加黃耆湯主之

○桂枝加黃耆湯方

桂枝

芍藥各二兩

甘草二兩

生姜三兩

大棗十二枚

黃耆二兩

右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服師曰寸口脈遲而濇遲則爲寒濇爲血不足跌陽脈微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脅鳴相逐氣轉勝脫榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍加麻辛附子湯主之

○桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯方

桂枝三兩

生姜三兩

甘草二兩

大棗十二枚

麻黃

細辛各二兩

附子一枚炮

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作枳朮湯主之

○枳朮湯方

枳實七枚

白朮二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中臍即當散也

附方

○外臺防已黃耆湯治風水脈浮爲在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰以上爲和腰以下當腫及陰難以屈伸方見風溼中

○黃疸病脈證并治第十五

論二首

脈證十四條

方七首

寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行○跌陽脈緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食即爲滿尺脈浮爲傷腎跌陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中

苦濁。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。額上黑。微汗出。手足中熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利。名曰女勞疸。腹如水狀不治。心中懊憹而熱。不能食。時欲吐。名曰酒疸。○陽明病。脈遲者。食難用飽。飽則發煩。頭眩。小便必難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。○夫病酒黃疸。必小便不利。其候心中熱。足下熱。是其證也。○酒黃疸者。或無熱。靖言了。腹滿欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。○酒疸。心中熱。欲吐者。吐之愈。○酒疸下之。久久爲黑疸。目青面黑。心中如噉蒜齧狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脈浮弱。雖黑微黃。故知之。

師曰。病黃疸發熱。煩喘胸滿口燥者。以病發時。火劫其汗。兩熱所得。然黃家所得。從溼得之。一身盡發熱。面黃壯熱。熱在裏。當下之。○脈沉渴。欲飲水。小便不利者。皆發黃。○腹滿舌痿黃。躁不得睡。屬黃家。舌痿疑作痿身○黃疸之病。當以十八日爲期。治之十日以上。瘥反劇爲難治。○疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。陽部其人振寒而發熱也。

穀疸之爲病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃爲穀疸。茵陳蒿湯主之。

○茵陳蒿湯方

茵陳蒿兩

梔子十四枚

大黃二兩

右三味。以水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

黃家日晡所發熱。而反惡寒。此爲女勞。得之膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑時澹。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。消石礬石散主之。

○消石礬石散方

消石 礬石燒等分

右二味爲散。以大麥粥汁和服。方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是候也。

酒黃疸。心中懊懣。或熱痛。梔子大黃湯主之。

○梔子大黃湯方

梔子十四枚 大黃兩一 枳實五枚 豉一升

右四味。以水六升。煮取二升。分溫三服。

諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。當以汗解之。宜桂枝加黃耆湯主之。方見水氣病中。

諸黃猪膏髮煎主之。

○猪膏髮煎方

猪膏半斤 亂髮如雞子大三枚

右二味。和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

黃疸病。茵陳五苓散主之。一本云茵陳湯及五苓散並主之。

○茵陳五苓散方

茵陳蒿末^{十分}

五苓散^{五分}○方見痰飲中。

右二味和先食飲方寸匕日三服。

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃消石湯。

○大黃消石湯方

大黃

黃礬

消石^{各四兩}

梔子^{十五枚}

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取一升頓服。

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之。^{方見痰飲中}

諸勞腹痛而嘔者宜柴胡湯。^{必小柴胡湯方見嘔吐中}

男子黃小便自利當與虛勞小建中湯。^{方見虛勞中}

附方

○葶蒂湯治諸黃。^{方見噦病中}

○千金麻黃醇酒湯治黃疸。

麻黃^{三兩}

右一味以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月用酒春月用水煮之。

○驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治第十六

脈證十二條

方五首

寸口脈動而弱。動卽爲驚。弱則爲悸。○師曰。尺脈浮。目睛暈黃。衄未止。暈黃去。目睛慧了。知衄今止。○又曰。從春至夏。衄者太陽。從秋至冬。衄者陽明。○衄家不可汗。汗出必額上陷。脈緊急。直視不能眴。不得眠。○病人面無血色。無寒熱。脈沉弦者。衄。浮弱。手按之絕者。下血。煩欬者。必吐血。○夫吐血。欬逆上氣。其脈數而有熱。不得臥者死。○夫酒客欬者。必致吐血。此因極飲過度所致也。○寸口脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相擊。此名曰革。婦人則半產漏下。男子則亡血。○亡血不可發其表。汗出卽寒慄而振。○病入胸滿。脣痿舌青。口燥。但欲嗽水。不欲嚥。無寒熱。脈微大來遲。腹不滿。其人言我滿。爲有瘀血。○病者如熱狀。煩滿口乾燥而渴。其脈反無熱。此爲陰伏。是瘀血也。當下之。火邪者。桂枝去芍藥。加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。

○桂枝救逆湯方

桂枝三兩
去皮

甘草二兩
炙

生姜三兩

牡蠣五兩
熬

龍骨四兩

大棗十二枚

蜀漆三兩
洗
去腥

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

心下悸者。半夏麻黃圓主之。

○半夏麻黃丸方

半夏 麻黃分等

右二味末之。煉蜜和丸。小豆大。飲服三九。日三服。吐血不止者。柏葉湯主之。

○柏葉湯方

柏葉 乾姜各三兩 艾把三

右三味。以水五升。取馬通汁一升。合煮取一升。分溫再服。

下血先便後血。此近血也。黃土湯主之。

○黃土湯方亦主吐血

甘草 乾地黄 白朮 附子炮

阿膠 黃芩各三兩

竈中黃土半斤

右七味。以水八升。煮取三升。分溫二服。

下血先血後便。此近血也。赤小豆當歸散主之。方見狐惑中

心氣不足。吐血衄血。瀉心湯主之。

○瀉心湯方亦治霍亂

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。

○嘔吐噦下利病脈證治第十七

論一首

脈證二十七條

方二十三首

夫嘔家有癰膿不可治。嘔膿盡自愈。○先嘔卻渴者。此爲欲解。先渴卻嘔者。爲水停心下。此屬飲家。嘔家本渴。今反不渴者。以心下有支飲故也。此屬支飲。○問曰。病人脈數。數爲熱。當消穀。引食而反吐者何也。師曰。以發其汗。令陽微。膈氣虛。脈乃數。數爲客熱。不能消穀。胃中虛冷故也。脈弦者虛也。胃氣無餘。朝食暮吐。變爲胃反。寒在於上。鑿反下之。今脈反弦。故名曰虛。○寸口脈微而數。微則無氣。無氣則榮虛。榮虛則血不足。血不足則胸中冷。○跌陽脈浮而濇。浮則爲虛。虛則傷脾。脾傷則不磨。朝食暮吐。暮飲朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈緊而濇。其病難治。○病人欲吐者。不可下之。噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。嘔而胸滿者。茱萸湯主之。

○茱萸湯方

吳茱萸升一

人參三兩

生姜六兩

大棗十二枚

右四味。以水五升。煮取三升。溫服七合。日三服。

乾嘔吐涎沫頭痛者。茱萸湯主之。上方見上

嘔而腸鳴。心下痞者。半夏瀉心湯主之。

○半夏瀉心湯方

半夏洗半斤

黃芩

乾姜

人參各三兩

黃連一兩

大棗十二枚

甘草三兩

右七味以水一斗。煮取六升。去滓。再煮取三升。溫服一升。日三服。乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯主之。

○黃芩加半夏生薑湯方

黃芩三兩

甘草二兩

芍藥一兩

半夏半升

生薑三兩

大棗十二箇

右六味以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

諸嘔吐穀不得下者。小半夏湯主之。方見痰飲中。

嘔吐而病在膈上。後思水者解。急與之。思水者猪苓散主之。

○猪苓散方

猪苓

茯苓

白朮各等分

右三味杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。

○四逆湯方

附子一枚生用

乾姜一兩

甘草二兩

右三味以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾姜三兩。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。

○小柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩三兩

人參三兩

甘草三兩

半夏半升

生姜三兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

胃反嘔吐者。大半夏湯主之。千金云。治胃反。不受食。食入即吐。外臺云。治嘔。心下痞澀者。

○大半夏湯方

半夏二升。洗。完用。

人參三兩

白蜜一升

右三味。以水一斗二升。和蜜。揚之二百四十遍。煮藥取二升半。溫服一升。餘分再服。

食已即吐者。大黃甘草湯主之。外臺方。又治吐水。

○大黃甘草湯方

大黃四兩

甘草一兩

右二味。以水三升。煮取一升。分溫再服。

胃反吐而渴。欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。

○茯苓澤瀉湯方。外臺治消渴。脈絕。胃反。口口者。有小口二升。

茯苓半斤

澤瀉四兩

甘草二兩

桂枝二兩

白朮三兩

生姜四兩

右六味以水一斗。煮取三升。內澤瀉再煮取二升半。溫服八合。日三服。
吐後渴飲得水而貪飲者。文合湯主之。兼主微風。脈緊頭痛。

○文蛤湯方

文蛤兩五

麻黃

甘草

生姜各三兩

石膏五兩

杏仁五十箇

大棗十二枚

右七味以水六升。煮取二升。溫服一升。汗出即愈。

乾嘔吐逆。吐涎沫。半夏乾薑散主之。

○半夏乾姜散方

半夏 乾姜各等分

右二味杵爲散。取方寸匕。漿水一升半。煎取七合。頓服之。

病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憤憤然無奈者。生薑半夏湯主之。

○生薑半夏湯方

半夏半升 生薑汁一升

右二味以水三升。煮半夏取二升。內生薑汁。煮取一升半。小冷分四服。日三夜一服。止停後服。

乾嘔噦。若手足厥者。橘皮湯主之。

○橘皮湯方

橘皮兩

生姜半斤

右二味。以水七升。煮取三升。溫服一升。下咽卽愈。

噦逆者。橘皮竹茹湯主之。

○橘皮竹茹湯方

橘皮斤

竹茹二升

大棗三十枚

生姜半斤

甘草兩

人參一

右六味。以水一斗。煮取三升。溫服一升。日三服。

夫六府氣絕於外者。手足寒。上氣腳縮。五藏氣絕於內者。利不禁。下甚者。手足不仁。○下利脈沉弦者。下重。脈大者爲未止。脈微弱數者爲欲自止。雖發熱不死。○下利手足厥冷無脈者。灸之不溫。若脈不還。反微喘者死。少陰負跌陽者爲順也。○下利有微熱而渴。脈弱者。今自愈。○下利脈數有微熱汗出。今自愈。設脈緊爲未解。○下利脈數而渴者。今自愈。設不差。必清膿血。以有熱故也。○下利脈反弦。發熱身汗者。自愈。○下利氣者。當利其小便。○下利寸脈反浮數。尺中自濇者。必清膿血。○下利清穀。不可攻其表。汗出必脹滿。○下利脈沉而遲。其人面少赤。身有微熱。下利清穀者。必鬱冒。汗出而解。病人必微厥。所以然者。其面戴陽。下虛故也。○下利後脈絕。手足厥令。晬時脈還。手足溫者生。脈不還者死。○下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。

○四逆湯方

上方見

○桂枝湯方

桂枝三兩
去皮

芍藥三兩

甘草三兩
炙

生姜三兩

大棗十二枚

右五味咬咀。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫服一升。服已。須臾啜稀粥一升。以助藥力。溫覆令一時許。遍身漰漰微似有汗者益佳。不可令如水淋漓。若一服汗出病差。停後服。

下利三部脈皆平。按之心下堅者。急下之。宜大承氣湯。○下利脈遲而滑者實也。利未欲止。急下之。宜大承氣湯。○下利脈反滑者。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。○下利已差。至其年月日時復發者。以病不盡故也。當下之。宜大承氣湯。

○大承氣湯方見瘕病中

下利譫語者。有燥屎也。小承氣湯主之。

○小承氣湯方

大黃四兩

厚朴三兩
炙

枳實大者三枚
炙

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。得利則止。

下利便膿血者。桃花湯主之。

○桃花湯方

赤石脂一斤。一半剉。
一半篩末。

乾姜兩

粳米一升

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。溫七合。內赤石脂末方寸匕。日三服。若一服愈。餘勿服。
熱利下重者。白頭翁湯主之。

○白頭翁湯方

白頭翁三兩

黃連

黃蘗

秦皮各三兩

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。不愈更服。
下利後更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。梔子鼓湯主之。

○梔子鼓湯方

梔子十四枚

香鼓四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內鼓。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐則止。
下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脈四逆湯主之。

○通脈四逆湯方

附子大者一枚
生用

乾姜三兩
強人
可四兩

甘草二兩
炙

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。
下利肺痛。紫參湯主之。

○紫參湯方

紫參斤半 甘草兩三

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升日分溫三服。疑非仲景方

氣利訶梨勒散主之。

○訶梨勒散方

訶梨勒十枚煨

右一味爲散粥飲和頓服。疑非仲景方

附方

○千金翼小承氣湯治大便不通噦數譫語。上方見 ○外臺黃芩湯治乾嘔下利。

黃芩 人參 乾姜各二兩 桂枝一兩 大棗十二枚 半夏半升

右六味以水七升煮取三升溫分三服。

○瘡癰腸癰浸淫病脈證并治第十八

論一首 脈證三條 方六首

諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發其癰師曰諸癰腫欲知有膿無膿以手掩腫上熱者爲有膿不熱者爲無膿。

腸癰之爲病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此爲腸內有癰膿薏苡附子敗醬

散主之。

○薏苡附子敗醬散方

薏苡仁^{十分}

附子^{二分}

敗醬^{五分}

右三味。杵爲末。取方寸匕。以水二升。煎減半。頓服。小使當下。

腫癰者。少腹腫痞。按之卽痛。如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血。脈洪數者。膿已成。不可下也。大黃牡丹湯主之。

○大黃牡丹湯方

大黃^{兩四}

牡丹^{兩一}

桃仁^{五十箇}

瓜子^{半升}

芒硝^{三合}

右五味。以水六升。煮取一升。去滓。內芒硝。再煎沸。頓服之。有膿當下。如無膿當下血。

問曰。寸口脈浮微而澁。法當亡血。若汗出。設不汗者。云何。答曰。若身有瘡。被刀斧所傷。亡血故也。病金瘡。王不留行散主之。

○王不留行散方

王不留行^{十分。八月採。}

蒴藋細葉^{十分。七月採。}

桑東南根^{白皮十分。三月三日採。}

甘草^{十八分}

川椒^{三分。除目及閉口。去汗。}

黃岑^{二分}

乾姜^{二分}

芍藥^{二分}

厚朴^{二分}

右九味。桑根皮以上三味。燒灰存性。勿令灰過。各別杵篩。合治之爲散。服方寸匕。小瘡卽粉之。大瘡

但服之。產後亦可服。如風寒。桑東根勿取之。前三物皆陰乾百日。

○排膿散方

枳實十六枚

芍藥六分

桔梗二

右三味。杵爲散。取雞子黃一枚。以藥散與雞黃相等。揉和令相得。飲和服之。日一服。

○排膿湯方

甘草二兩

桔梗三兩

生薑一兩

大棗十枚

右四味。以水三升。煮取一升。溫服五合。日再服。

浸淫瘡。從口流向四支者。可治。從四支流來入口者。不可治。

浸淫瘡。黃連粉主之。方未見

○跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脈證治第十九

論一首

脈證一條

方五首

師曰。病跌蹶。其人但能前不能卻。刺腓入二寸。此太陽經傷也。

病人常以手指臂腫動。此人身體羸。羸者藜蘆甘草湯主之。

○藜蘆甘草湯方未見

轉筋之爲病。其人臂脚直。脈上下行。微弦。轉筋入腹者。雞屎白散主之。

○雞屎白散方

雞屎白

右一味爲散。取方寸匕。以水六合。和溫服。陰狐疝氣者。偏有小大。時時上下。蜘蛛散主之。

○蜘蛛散方

蜘蛛十四枚
熬焦

桂枝兩半

右二味爲散。取八分一匕。飲和服。日再服。蜜圓亦可。

問曰。病腹痛有虫。其脈何以別之。師曰。腹中痛。其脈當沉。若弦反洪大。故有虵蟲。虵蟲之爲病。令人吐涎心痛。發作有時。毒藥不止。甘草粉蜜湯主之。

○甘草粉蜜湯方

甘草兩二

粉一兩
重

蜜四兩

右三味。以水三升。先煮甘草。取二升。去滓。內粉蜜攪令和。煎如薄粥。溫服一升。差卽止。

虵厥者。當吐虵。令病者靜而復時煩。此爲藏寒。虵上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。虵聞食臭出。其人當自吐虵。

虵厥者。烏梅圓主之。

○烏梅圓方

烏梅三百箇

細辛六兩

乾薑十兩

黃連一斤

當歸四兩

附子六兩炮

川椒四兩去汗

桂枝六兩

人參

黃蘗各六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成溼和藥令相得內臼中與蜜杵二千下圓如梧子大先食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷滑臭等食

新編金匱要略方論卷下

○婦人妊娠病脈證并治第二十

證三條

方九首

師曰。婦人得平脈。陰脈小弱。其人渴。不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。方見利中於法六十日。當有此證。設有醫治逆者。卻一月加吐下者。則絕之。

婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。爲癥瘕害。妊娠六月動者。前三月經水利。時胎也。下血者。後斷三月。卽也。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。桂枝茯苓圓主之。

○桂枝茯苓丸方

桂枝

茯苓

牡丹去心

桃仁去皮尖熬

芍藥各等分

右五味。末之。煉蜜和丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知。加至三丸。

婦人懷娠六七月。脈弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒者。少腹如扇。所以然者。子藏開故也。當以附子湯溫其藏。方未見

師曰。婦人有漏下者。有半產後因續下血。都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻膠。艾湯主之。

○芎歸膠艾湯方一方加乾姜一兩。胡洽治婦人胞動無乾姜。

芎藭

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

四兩

乾地黄

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作婦人懷娠腹中疴痛當歸芍藥散主之。

○當歸芍藥散方

當歸

三兩

芍藥

一斤

茯苓

四兩

白朮

四兩

澤瀉

半斤

芎藭

半斤

乙作三兩

右六味杵爲散取方寸匕酒和日三服。

妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之。

○乾姜人參半夏丸方

乾姜

人參

各兩

半夏

二兩

右三味末之以生薑汁糊爲丸如梧子大飲服十九日三服。

妊娠小便難飲食如故當歸貝母苦參丸主之。

○當歸貝母苦參丸方

男子加滑石半兩

當歸

貝母

苦參

各四兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸。

妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起卽頭眩。葵子茯苓散主之。

○葵子茯苓散方

葵子一斤 茯苓兩三

右二味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。小便利則愈。

婦人妊娠。宜常服當歸散主之。

○當歸散方

當歸 黃芩 芍藥 芎藭各一斤 白朮半斤

右五味。杵爲散。酒飲服方寸匕。日再服。妊娠常服卽易產胎。無苦疾。產後百病悉主之。

妊娠養胎。白朮散主之。

○白朮散方見外

白朮 芎藭 蜀椒三分 牡蠣

右四味。杵爲散。酒服一錢匕。日三服。夜一服。但苦痛加芍藥。心下毒痛倍加芎藭。心煩吐痛不能食。飲加細辛一兩。半夏大者二十枚。服之後。更以醋漿水服之。若嘔。以醋漿水服之。復不解者。小麥汁服之。已後渴者。大麥粥服之。病雖愈。服之勿置。

婦人傷胎。懷身腹滿。不得小便。從腰以下重。如有水氣狀。懷身七月。太陰當養不養。此心氣實。當刺瀉勞

宮及關元小便微利則愈。見玉函。

○婦人產後病脈證治第二十一

論一首

證六條

方八首

問曰。新產婦人有三病。一者病瘕。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病瘕。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。產婦鬱冒。其脈微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。方見嘔吐中。

病解能食。七八日更發熱者。此爲胃實。大承氣湯主之。見瘕病中。

產後腹中疔痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。

○當歸生薑羊肉湯方。見寒疝中。

產後腹痛。煩滿不得臥。枳實芍藥散主之。

○枳實芍藥散方

枳實燒令黑勿大過。

芍藥等分。

右二味。杵爲散。服方寸匕。日三服。并主癰膿。以麥粥下之。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此爲腹中有乾血着臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水

不利。

○下瘀血湯方

大黃_{三兩}

桃仁_{二十枚}

蟅虫<sub>二十枚
熬去足</sub>

右三味末之。煉蜜和爲四丸。以酒一升煎一丸。取八合頓服之。新血下如豚肝。

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱。切脈微實。再倍發熱。日晡時煩躁者。不食。食則讞語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在裏結在膀胱也。_{見瘕病中。}

產後風續之數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔汗出。雖久。陽旦證續在耳。可與陽旦湯。_{枝湯。方見下利中。}

產後中風發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。

○竹葉湯方

竹葉_{一把}

葛根_{三兩}

防風_{一兩}

桔梗

桂枝

人參

甘草_{各一兩}

附子<sub>一枚
炮</sub>

大棗_{十五枚}

生姜_{五兩}

右十味。以水一斗。煮取二升半。分溫三服。溫覆使汗出。○頸項強。用大附子一枚。破之如豆大。前藥揚去沫。嘔者加半夏半升洗。

婦人乳中虛煩亂嘔逆。安中益氣。竹皮大圓主之。

竹皮大丸方

生竹茹分二 石膏分二 桂枝分一 甘草分七 白薇分一

右五味末之。棗肉和丸。彈子大。以飲服。一九。日三夜二服。有熱者倍白薇。煩喘者加柏實一分。產後下利虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。

○白頭翁加甘草阿膠湯方

白頭翁 甘草 阿膠各二兩 秦皮 黃連 蘗皮各三兩

右六味以水七升。煮取二升半。內膠令消盡。分溫三服。

附方

○千金三物黃芩湯。治婦人在草蓐自發露得風。四肢苦煩熱頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛但煩者。此湯主之。

黃芩兩一 苦參兩二 乾地黄兩四

右三味以水六升。煮取二升。溫服一升。多吐下虫。

○千金內補當歸建中湯。治婦人產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦少腹中急。摩痛引腰背。不能食飲。產後一月。日得服四五劑爲善。令人強壯宜。

當歸兩四 桂枝兩三 芍藥兩六 生姜兩三 甘草兩二 大棗十二枚

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上煖令飴消若去血過多崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯成內阿膠若無當歸以芎藭代之若無生姜以乾姜代之

○婦人雜病脈證并治第二十二

論一首

脈證合十四條

方十四首

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴

胡湯主之

方見嘔吐中

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讞語如見鬼狀者此爲熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胸脇滿如結胸狀讞語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之

陽明病下血讞語者此爲熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之濺然汗出者愈婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

○半夏厚朴湯方

千金作胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下

半夏升一

厚朴兩三

茯苓兩四

生姜兩五

乾蘇葉兩二

右五味。以水七升。煮取四升。分溫四服。日三夜一服。

婦人藏躁。喜悲傷。欲哭象。如神靈所作。數欠伸。甘麥大棗湯主之。

○甘草小麥大棗湯方

甘草三兩

小麥一升

大棗十枚

右三味。以水六升。煮取三升。溫分三服。亦補脾氣。

婦人吐涎沫。醫反下之。心下即痞。當先治其吐涎沫。小青龍湯主之。涎沫止。乃治痞。瀉心湯主之。

○小青龍湯方見肺癰中

○瀉心湯方見驚悸中

婦人之病。因虛積冷。結氣爲諸經水斷絕。至有歷年血寒積結胞門。寒傷經絡。凝堅在上。嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在中盤結。繞臍寒疝。或兩脇疼痛。與藏相連。或結熱中。痛在關元。脈數無瘡。肌若魚鱗。時著男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰掣痛。少腹惡寒。或引腰脊。下根氣街。氣衝急痛。膝脛疼煩。奄忽眩冒。狀如厥癰。或有憂慘。悲傷多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。脈虛多寒。三十六病。千變萬端。審脈陰陽。虛實緊弦。行其針藥。治危得安。其雖同病。脈各異源。子當辯記。勿謂不然。

問曰。婦人年五十。所病下利數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇口乾燥。故知之。當以溫經湯主之。

○溫經湯方

吳茱萸兩三

當歸

芍藥

芍藥各二兩

人參

桂枝

阿膠

牡丹皮去

生姜

甘草各二兩

半夏半升

麥門冬去心一升

右十二味，以水一斗，煮取三升，分溫三服。○亦主婦人少腹寒，久不受胎，兼取崩中去血，或月水來過多，及至期不來。

帶下經水不利，少腹滿痛，經一月再見者，土瓜根散主之。

○土瓜根散陰癰腫亦主之

土瓜根

芍藥

桂枝

蠶虫各三分

右四味，杵爲散，酒服方寸匕，日三服。

寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減則爲寒，芤則爲虛，寒虛相搏，此名曰革。婦人則半產漏下，旋覆花湯主之。

○旋覆花湯方

旋覆花三兩

葱莖十四

新絳少許

右三味，以水三升，煮取一升，頓服之。

婦人陷經漏下，黑不解，膠姜湯主之。臣億等按諸本無膠姜湯方，想是妊娠中膠艾湯。

婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後者此爲水與血俱結在血室也。大黃甘遂湯主之。

○大黃甘遂湯方

大黃兩四

甘遂兩二

阿膠兩二

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。其血當下。

婦人經水不利下。抵當湯主之。亦治男子膀胱滿急有瘀血者。

○抵當湯方

水蛭三十箇熬

蟲虫三十枚熬去翅足

桃仁二十箇去皮尖

大黃三兩酒浸

右四味。爲末。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。

婦人經水閉不利。藏堅癖不止。中有乾血。下白物。礬石丸主之。

○礬石丸方

礬石三分燒

杏仁一分

右二味。末之。煉蜜和丸。棗核大。內藏中劇者再內之。

婦人六十二種風。及腹中血氣刺痛。紅藍花酒主之。

○紅藍花酒方疑非仲景方

紅藍花兩一

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未止再服。

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之。

○當歸芍藥散方見前妊娠中

婦人腹中痛小建中湯主之。

○小建中湯方見前虛勞中

問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣圓主之。

○腎氣丸方

乾地黄八兩

薯蕷四兩

山茱萸四兩

澤瀉三兩

茯苓三兩

牡丹皮三兩

桂枝

附子炮各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸加至二十五丸日再服。

○蛇床子散方溫陰中坐藥

蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和合相得如棗大綿裹內之自然溫。

少陰脈滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之。

○狼牙湯方

狼牙三兩

右一味。以水四升。煮取半升。以綿纏筋如繭。浸湯瀝陰中。日四遍。胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。膏髮煎導之。

○膏髮煎方見黃疸中

○小兒疳虫蝕齒方疑非仲景方

雄黃 葶藶

右二味。末之。取膈日豬脂。鎔以槐枝綿裹頭四五枚。點藥烙之。

○雜療方第二十三

論一首

證一條

方二十二首

退五藏虛熱。四時加減柴胡飲子方。

冬三月加柴胡八分

白朮八分

大腹賓郎四枚并皮子用

陳皮五分

生薑五分

桔梗七分

春三月加枳實

減白朮共六味

夏三月加生薑三分

枳實五分

甘草三分共八味

秋三
月加陳皮六分共

右各咬咀，分爲三貼。一貼以水三升，煮取二升，分溫三服。如人行四五里進一服。如四體壅，添甘草少許，每貼分作三小貼，每小貼以水一升，煮取七合，溫服，再合滓爲一服，重煮都成四服。疑非仲景方

○長服訶梨勒丸方景方

訶梨勒 陳皮 厚朴 各三兩

右三味末之，煉蜜丸如梧子大，酒飲服二十九，加至三十九。

○三物備急丸方見千金，司空裴秀爲散用亦可。先和成汁，乃傾口中，令從齒間得入，至良驗。

大黃兩 乾姜兩 巴豆 一兩去皮心熬外研如脂

右藥各須精新，先擣大黃乾姜爲末，研巴豆內中，合治一千杵，用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之，莫令歇。○主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刺，氣急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒服大豆許三四丸，或不下，捧頭起，灌令下咽，須臾當差。如未差，更與三丸。當腹中鳴，卽吐下便差。若口噤，亦須折齒灌之。

治傷寒令愈不復，紫石寒食散方。見千金翼

紫石英

白石英

赤石脂

鍾乳銕

栝樓根

防風

桔梗

文蛤

鬼臼各十分

太餘糧燒十分

乾姜

附子炮去皮

桂枝去皮各四分

右十三味杵爲散酒服方寸匕。

○救卒死方

薤搗汁灌鼻中。

○又方

雄雞冠割取血管吹內鼻中。

豬脂如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中。

雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起。

大豆二七粒以雞子白并酒和盡以吞之。

○救卒死而壯熱者方

礬石半斤以水一斗半煮消以漬腳令沒踝。

○救卒死而目閉者方

騎牛臨面搗薤汁灌耳中吹皂莢末鼻中立效。

○救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散。有巴豆者。

○救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升。水三斗。煮取二斗以洗之。又取牛洞稀糞也一升。溫酒灌口中。灸心下一寸。臍上三寸。臍

下四寸。各一百壯。差。

○救小兒卒死而吐利不知是何病方

狗屎一丸。絞取汁以灌之。無濕者。水煮乾者取汁。

○尸蹙脈動而無氣。氣閉不通。故靜而死也。治方。脈證爲上卷

草蒲屑。內鼻兩孔中吹之。令人以桂屑着舌下。

○又方

剔取左角髮方寸燒末。酒和灌令入喉。立起。

○救卒死客忤死還魂湯主之方

千金方云。主卒忤鬼擊飛尸。諸奄忽氣絕無復覺。或已無脈。口禁拘不開。去齒下湯。湯下口不下者。分病人髮。左右捉搗肩引之。藥下復增取一升。須臾立甦。

麻黃三兩去節。一方四兩。

杏仁去皮尖。七十箇。

甘草一兩炙。

○千金用桂心二兩。

右三味。以水八升。煮取三升。去滓。分令咽之。通治諸感忤。

○又方

韭根一把。

烏梅二七箇。

吳茱萸半升炒。

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去滓分飲之。

○救自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難也恐此當言忿氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之方。

徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以腳踏其兩肩手少挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胸上數動之一人摩捋臂脛屈伸之若已殭但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿若勞之須臾可少桂湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥及稍止若向冷兩人以管吹其兩耳朵好此法最善無不活者。

○凡中喝死不可使得冷得冷便死療之方。

屈草帶繞喝人臍使三兩人溺其中令溫亦可用熱泥和屈草亦可扣瓦碗底按及車缸以着喝人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當令溺其中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不可泥及車缸恐此物冷喝既在夏月得熱泥土暖車缸亦可用也。

○救溺死方

取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔卽活。

右療自縊溺喝之法竝出自張仲景爲之其意殊絕殆非常情所及本草所能關實救人之大術矣。傷寒家數有喝病非此遇熱之喝見外臺肘後日。

○治馬墜及一切筋骨損方見肘後方

大黃一兩切。使湯成下。 緋帛如手大燒灰

亂髮如雞子大燒灰用

久用炊單布一尺燒灰

敗蒲一握三寸

桃仁四十九箇去皮尖熬 甘草如中指炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛楚立差利及浴水赤勿怪卽瘀血也

○禽獸魚虫禁忌并治第二十四

論辯二首 合九十法 方二十一首

凡飲食滋味以養於生食之有妨反能爲害自非服藥煉液焉能不飲食乎切見時人不閑調攝疾疢競起若不因食而生苟全其生須知切忌者矣所食之味有與病相宜有與身爲害若得宜則益體害則成疾以此致危例皆難療凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之○肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不食脾辯曰春不食肝者爲肝氣旺脾氣敗若食肝則又補肝脾氣敗尤甚不可救又肝旺之時不可以死氣入肝恐復魂也若非王時卽虛以肝補之佳余藏準此

凡肝臟自不可輕噉白死者彌甚○凡心皆爲神識所舍勿食之使人來生復其報對矣○凡肉及肝落地不着塵土者不可食之○猪肉落水浮者不可食○諸肉及魚若狗不食鳥不啄者不可食○諸肉不

乾火炙不動。見水自動者不可食之。○肉中有如朱點者不可食之。○六畜肉熱血不斷者不可食之。○父母及身本命肉食之。令人神魂不安。○食肥肉及熱羹不得飲冷水。○諸五藏及魚投地塵土不汚者不可食之。○穢飯餒肉臭魚食之皆傷人。○自死肉口閉者不可食之。○六畜自死皆疫死。則有毒不可食之。○獸自死北首及伏地者食之殺人。○食生肉飽飲乳變成白虫。一作血蠱○疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積。宜利藥下之。○脯臠米甕中有毒及經夏食之發腎病。

治自死六畜肉中毒方

黃蘗屑搗服方寸匕。

治食鬱肉漏脯中毒方。鬱肉：密器蓋之隔宿者是也。漏脯：茅屋漏下沾着者是也。

燒犬屎酒服方寸匕。每服人乳汁亦良。○飲生韭汁三升亦得。

治黍米中藏乾脯食之中毒方

大豆濃煮汁飲數升即解。亦治狸肉漏脯等毒。

治食生肉中毒方

掘地深三尺。取其下土三升。以水五升煮數沸。澄清汁飲一升即愈。

治六畜鳥獸肝中毒方

水浸豆豉絞取汁服數升愈。

馬脚無夜眼者不可食之。○食酸馬肉不飲酒則殺人。○馬肉不可熟食傷人心。○馬鞍下肉食之殺人。○白馬黑頭者不可食之。○白馬青蹄者不可食之。○馬肉獬肉共食飽醉臥大忌。○驢馬肉合猪肉食之成霍亂。○馬肝及毛不可妄食中毒害人。

治馬肝毒中人未死方

雄鼠屎二七粒末之水和服日再服。屎尖者是。

又方

人垢取方寸匕服之佳。

治食馬肉中毒欲死方

香鼓二兩 杏仁三兩

右二味蒸一食頃熟杵之服日再服。

又方

煮蘆根汁飲之良。

疫死牛或目赤或黃食之大忌。○牛肉共猪肉食之必作寸白虫。○青牛腸不可合犬肉食之。○牛肺從三月至五月其中有虫如馬尾割去勿食食則損人。○牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹内生虫。○噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也。

治噉蛇牛肉食之欲死方

飲人乳汁一升立愈

又方

以泔洗頭飲一升愈

牛肚細切以水一斗煮取一升煖飲之大汗出者愈

治食牛肉中毒方

甘草煮汁飲之即解

羊肉其有宿熱者不可食之。○羊肉不可共生魚酪食之害人。○羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癲。○白羊黑頭食其腦作腸癰。○羊肝共生椒食之破人五藏。○猪肉共羊肝和食之令人心悶。○猪肉以生胡荽同食爛人臍。○猪脂不可合梅子食之。○猪肉和葵食之少氣。○鹿人不可和蒲白作羹。食之發惡瘡。○麋脂及梅李子若妊婦食之令子青盲。男子傷精。○驢肉不可合煨及生菜梅李果食之皆病人。○痼疾人不可食熊肉令終身不愈。○白犬自死不出舌者食之害人。○食狗鼠餘令人發瘻瘡。

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下方

杏仁一升合皮
熟研用

以沸湯三升和取汁分三服利下肉片大驗

婦人妊娠不可食兔肉、山羊肉、及鰲、鷄、鴨。令子無聲音。○兔肉不可合白鷄肉食之。令人面發黃。○兔肉着乾姜食之。成霍亂。○凡鳥自死。口不閉。翅不合者。不可食之。○諸禽肉。肝青者。食之殺人。○鷄有六翮四距者。不可食之。○烏鷄白首者。不可食之。○鷄不可共葫蒜食之。滯氣。一云鷄子○山鷄不可合鳥獸肉食之。○雉肉久食之。令人瘦。○鴨卵不可合鰲肉食之。○婦人妊娠食雀肉。令子淫亂無恥。○雀肉不可合李子食之。○燕肉勿食。入水爲蛟龍所噉。

鳥獸有毒。箭死者。其肉有毒。解之方。

大豆煮汁及鹽汁服之解。

魚頭正白如連珠至脊上。食之殺人。○魚頭中無腮者。不可食之。殺人。○魚無腸膽者。不可食之。三年陰不起。女子絕生。○魚頭似有角者。不可食之。○魚目合者。不可食之。○六甲日勿食鱗甲之物。○魚不可合鷄肉食之。○魚不得合鸕鶿肉食之。○鯉魚鮮不可合小豆藿食之。其子不可合猪肝食之。害人。○鯉魚不可合犬肉食之。○鯽魚不可合猴雉肉食之。云一不可合猪肝食。○鯢魚合鹿肉生食。令人筋甲縮。○青魚鮮不可合生葫荽及生葵并麥中食之。鱖鱔不可合白犬血食之。○龜肉不可合酒菓子食之。○鰾目凹陷者。及厭下有王字形者。不可食之。○其肉不得合鷄鴨子食之。○龜鰾肉不可合莧菜食之。○鰾無須及腹下通黑。煮之反白者。不可食之。○食膾飲乳酪。令人腹中生虫爲瘕。

鱸食之在心胸間不化。吐復不出。速下除之。久成癥病。治之方。

橘皮一兩 大黃二兩 朴消二兩

右三味以水一大升。煮至小升。頓服。卽消。食齰多不消。結爲癥病。治之方。

馬鞭草

右一味。搗汁飲之。○或以姜葉汁飲之一升亦消。○又可服吐藥吐之。食魚後食毒兩種煩亂治之方

橘皮

濃煎汁服之卽解。

食鰕鯪魚中毒方

蘆根

煮汁服之卽解。

蟹目相向。足班目赤者。不可食之。

食蟹中毒治之方

紫蘇

煮汁飲之三升。○紫蘇子搗汁飲之亦良。

又方

冬瓜汁飲二升。食冬瓜亦可。

凡蟹未遇霜多毒。其熟者乃可食之。○蜘蛛落食中。有毒。勿食之。○凡蜂蠅虫蟻等多集食上。食之致癰。

○果實菜穀禁忌并治第二十五

果子生食生瘡。○果子落地經宿。虫蟻食之者。人大忌食之。○生米停留多日有損處。食之傷人。○桃子多食。令人熱。仍不得入水浴。令人病淋瀝寒熱病。○杏酪不熟傷人。○梅多食壞人齒。○李不可多食。令人臃脹。○林檎不可多食。令人百脈弱。○橘柚多食。令人口爽不知五味。○梨不可多食。令人寒中。金瘡產婦亦不宜食。○櫻桃杏多食。傷筋骨。○安石榴不可多食。損人肺。○胡桃不可多食。令人動痰飲。○生棗多食。令人熱渴氣脹。寒熱羸瘦者。彌不可食。傷人。

食諸果中毒治之方

猪骨燒過

右一味。末之。水服方寸匕。○亦治馬肝漏脯等毒。木耳赤色。及仰生者勿食。○菌仰卷及赤色者不可食。

食諸菌中毒悶亂欲死治之方

人糞汁飲一升

土漿飲一二升

大豆濃煮汁飲之

服諸吐利藥並解

食楓柱菌而哭不止治之以前方

誤食野芋煩毒欲死治之方

以前方

其野芋根山東人名魁芋。人種芋三年不收。亦成野芋。並殺人。

蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣病欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之方

肉桂煎汁飲之

多飲冷亦一二升

或食蒜

或飲地漿

或濃煮豉汁飲之並解

正月勿食生葱令人面生游風。○二月勿食蓼傷人腎。○三月勿食小蒜傷人志性。○四月八月勿食胡
萎傷人神。○五月勿食韭令人乏氣力。○五月五日勿食一切生菜發百病。○六月七月勿食菜莢傷神
氣。○八月九月勿食姜傷人神。○十月勿食椒損人心傷心脈。○十一月十二月勿食薤令人多涕唾。○
四季勿食生葵令人飲食不化發百病。非但食中藥中皆不可用。深宜慎之。○時病差未健食生菜手足
必腫。○夜食生菜不利人。○十月勿食被霜生菜令人面無光目澁心痛腰疼或發心瘡瘡發時手足十
指爪皆青困委。○葱韭初生芽者食之傷人心氣。○飲白酒食生韭令人病增。○生葱不可共蜜食之殺
人。獨蒜蒜彌忌。○棗合生葱食之令人病。○生葱和雄雞雉白犬肉食之令人七竅經年流血。○食糖蜜
後四日內食生葱韭令人心痛。○夜食諸姜蒜葱等傷人心。○蕪菁根多食令人氣脹。○薤不可共牛肉
作羹食之成瘦病。韭亦然。○蓴多病動痔疾。○野苣不可同蜜食之作內痔。○白苣不可共酪同食作蠶
虫。○黃瓜食之發熱病。○葵心不可食傷人。葉尤冷黃背赤莖者勿食之。○胡荽久食之令人多忘。○病

人不可食胡荽及黃花菜。○芋不可多食。動病。○妊婦食姜令子餘指。○蓼多食發心痛。○蓼和生魚食之。令人奪氣。陰欬疼痛。○芥菜不可共兔肉食之。成惡邪病。○小蒜多食傷人心力。

食躁或躁方

豉

濃煮汁飲之。

鉤吻與芹菜相似。誤食之殺人。解之方。肘後云與茱萸食芹相似。

薺
薺兩八

右一味。水六升。煮取二升。分溫二服。鉤吻生地。傍無他草。其莖有毛。以此別之。

菜中有水蓼。莖葉圓而光。有毒。誤食之。令人狂亂。狀如中風。或吐血。治之方。

甘草

煮汁服之即解。

春秋二時。龍帶精入芹菜中。人偶食之爲病。發時手背腹滿。痛不可忍。各蛟龍病治之方。

硬糖二三升

右一味。日兩度服之。吐出如蜥蜴三五枚。差。

食苦瓠中毒治之方

黎穰

養汁數服之解。

扁豆寒熱者不可食之。○久食小豆令人枯燥。○食大豆屑忌噉猪肉。○大麥久食令人作癰。○白黍米不可同飴蜜食亦不可合葵食之。○苽麥麵多食之令人髮落。○鹽多食傷人肺。○食冷物冰人齒。○食熱物勿飲冷水。○飲酒食生蒼耳令人心痛。○夏月大醉汗流不得冷水洗着身及使扇卽成病。○飲酒大忌灸腹背令人腸結。○醉後勿飽食發寒熱。○飲酒食猪肉臥秫稻穰中則發黃。○食飴多飲酒大忌。○凡水及酒照見人影動者不可飲之。○醋合酪食之令人血瘕。○食白米粥勿食生蒼耳成走注。○食甜粥已食鹽卽吐。○犀角筋攪飲食沫出及澆地墳起者食之殺人。

飲食中毒煩滿治之方

苦參三兩 苦酒半升

右二味煮三沸三上三下服之吐食出卽差或以水煮亦得。

又方犀角湯亦佳。

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方。

鹽一升 水三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差。

礬石生入腹。破人心肝。亦禁水。○商陸以水服。殺人。○葶藶子傳頭瘡藥。成入腦。殺人。○水銀入人耳。及六畜等皆死。以金銀着耳邊。水銀則吐。○苦練無子者。殺人。

凡諸毒多是假毒。以投元。知時宜。煮甘草薺芫汁飲之。通除諸毒藥。

編主五雲王

編初成集書叢

論方略要匱金編新

中華民國二十九年六月初版

大湘

述者 張仲景

集者 王叔和

發行人 王雲五
長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館
各埠

(本書校對者毛鵬基)

G 一六〇五上

